

NATUURTYPEN



- Legenda
- Bos nieuw, nat, N14.01, essen-vogelkersbos, >70% zwarte els, spontane ontwikkeling met geringe aanplant
 - Bos nieuw, vochtig-nat, N14.01, essen-vogelkersbos, spontane ontwikkeling met geringe aanplant
 - Bos nieuw, vochtig, N14.03 haagbeuken- en essenbos
 - Bos nieuw, droog, N15.02, dennen-, eiken- beukenbos
 - Bos nieuw, droog, N15.02, dennen-, eiken- beukenbos, special 'Plantage' 75% ruwe berk + 25% krentenboompje
 - Bos nieuw, droog, N17.03, park- en stinzenbos met exoten, sierheesters 'Engels Hout'
 - Struiklaag nieuw, droog, N15.02, dennen-, eiken- beukenbos
 - Struiklaag nieuw, droog, N17.03, park- en stinzenbos met exoten, 'rode kornoelje'
 - Struiklaag nieuw, droog, N17.03, park- en stinzenbos met exoten, 'brembosjes'
 - Plantafstand bos- en struiklaag 1,5 x 2,0 m
 - Grasland nieuw, N12.02 Kruiden- en faunarijck grasland
 - Akker nieuw, N12.05 Kruiden- en faunarijck akker
 - Laanbomen, nieuw moeraseik (ME) moerascypres (MC)
 - Laanbomen, bestaand en aanvullen met enkele ontbrekende bomen zomereik (ZE)
 - Singels, nieuw zwarte els (knot), zomereik, es (knot), wilg (knot) vlier en sleedoorn
 - Singels, bestaand
 - Uitgangspunten:
GHG > 30 cm boven maaiveld:
nat bos: essen-vogelkersbos N14.01 met >70% zwarte els
GHG om en nabij maaiveld:
vochtig nat bos: essen-vogelkersbos N14.01
GHG 10-30 cm beneden maaiveld:
vochtig bos: haagbeuken- en essenbos N14.03
GHG > 30 cm beneden maaiveld:
droog bos: dennen-, eiken- en beukenbos N15.02 of park- en stinzenbos N17.03
GHG = gemiddeld hoogste grondwaterstand