
Memo

memonummer	202005	
datum	16-04-2019	
aan	[redacted]	Kooivis
van	[redacted]	Buijs Eco Consult B.V.
project	Onderzoek geschikte gebieden voor visdief	
projectnr.	202005	
betreft	Inventarisatie geschikte gebieden visdief	
Bijlagen		

1. Inleiding

Vanuit de beschikking van de ODH met het kenmerk ODH-2017-0004874, dient door de gebruikmakers van deze beschikking jaarlijks voor 15 maart een kaart overlegd te worden met gebieden die geschikt en ongeschikt zijn voor visdieven. Als deze gebieden geschikt zijn voor visdief dient hier minimaal 300 meter afstand van te worden gehouden om verstoring van broedende visdieven uit te kunnen sluiten in de periode 15 april – 15 augustus. Met de OZHZ [redacted] is contact geweest met de gebruikmakers van de ontheffing [redacted] over het tijdstip van deze inventarisatie. Hieruit is naar voren gekomen de inventarisatie uit te voeren in het actieve seizoen van de visdief om ze de potentierijke gebieden in beeld te krijgen. Namens de gebruikmakers heeft [redacted] aan [redacted] Eco Consult ([redacted]) gevraagd deze inventarisatie uit te voeren. Deze memo beschrijft de locaties die geschikt en ongeschikt zijn langs het oranje gearceerde gebied in figuur 1 op basis van een veldbezoek uitgevoerd op 22 mei 2020.



Figuur 1 Kaart met oranje gearceerde delen die nadere beoordeling voor visdief behoeven

2. Bevindingen visdief

Geschikte locaties

Tijdens het terreinbezoek is 1 locatie bij het zogenaamde Slaak (bij de Plaat van de Vliet) langs het oranje gearceerde deel geschikt bevonden voor visdief. Het betreft een recent aangelegd eilandje dat onderdeel was van de compensatie voor ruimteverlies van Windpark Krammer (zie figuur 2 t/m 4). In 2018 hebben hier ook visdieven zich gevestigd maar zijn de nesten gepredeerd door vos, waarna vestiging in 2019 en 2020 tot dusver uitbleef. Tijdens het terreinbezoek is wel vestiging van 2 paar kleine plevier en strandplevier vastgesteld (zie figuur 5). Op de Krammerse slikken is wel een visdiefkolonie vastgesteld (zie figuur 6) bij het aanhouden van 25 meter uit de oeververdediging gaf dit geen verstoring (afstand tot kolonie circa 230 meter).



Figuur 2 Eilandje tegen vooroever dat geschikt is voor visdief



Figuur 3 Schaars begroeid eilandje tegen vooroever dat geschikt is voor visdief



Figuur 4 Schaars begroeid eilandje tegen vooroever dat geschikt is voor visdief



Figuur 5 Eidop uitgekomen ei strandplevier



Figuur 6 Eilandjes met visdief Krammerse slikken

Ongeschikte locaties

De overige oeververdedigingen langs de oranje gearceerde delen in figuur 1 zijn ongeschikt voor visdief door regelmatige overspoeling en door de aanwezigheid van opgaande begroeiing (zie voor impressie figuur 7 t/m 14). Uit literatuurstudie (kustbroedvogelrapportages DMP) blijkt dat er in de laatste 10 jaar geen sprake is geweest van broedende visdieven op de oeververdedigingen en aangrenzende eilanden.


Figuur 7 Ongeschikt biotoop voor visdief door opgaande begroeiing



Figuur 8 Ongeschikt biotoop voor visdief door opgaande begroeiing en aangrenzde kolonie zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw (Slaakeiland)



Figuur 9 Ongeschikt biotoop voor visdief door opgaande begroeiing en ontbreken geschikt substraat op oeververdediging



Figuur 10 Ongeschikt biotoop voor visdief door opgaande begroeiing en ontbreken geschikt substraat op oeververdediging



Figuur 11 Ongeschikt biotoop voor visdief door opgaande begroeiing en ontbreken geschikt substraat op oeververdediging



Figuur 12 Ongeschikt biotoop voor visdief door opgaande begroeiing en ontbreken geschikt substraat op oeververdediging



Figuur 13 Ongeschikt biotoop voor visdief door opgaande begroeiing en ontbreken geschikt substraat op oeververdediging



Figuur 14 Ongeschikt biotoop voor visdief door opgaande begroeiing en ontbreken geschikt substraat op oeververdediging

2. Bevindingen overige soorten

Tijdens de inventarisatie bleek dat het benaderen van het slaakeiland binnen 25 meter wel tot verstoring leidt van de daar broedende lepelaars en gemengde kolonie zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen (zie figuur 15 voor ligging). Derhalve wordt geadviseerd om ter plaatse van het Slaakeiland in de periode 1 maart tot 1 augustus 300 meter uit de vooroeververdediging van het Slaakeiland te blijven. Ook dient in de vestigingsfase en broedfase (december t/m juli) van de zeearend het gebied rond het kunstnest (zie figuur 16) te worden ontweken. Omdat zeearenden zeer gevoelig zijn dient een afstand van 300 meter uit de vooroeververdediging te worden aangehouden ter plaatse van het eiland met kunstnest. Tot slot zijn er op de vooroeververdediging van de Krammerse slikken nog een kleine kokmeeuwkolonie vastgesteld (zie figuur 17 en 18). Als hier 300 meter uit de vooroeververdediging wordt gewerkt in de periode 15 maart tot 15 juli kan verstoring worden uitgesloten.



Figuur 15 Ligging Slaakeiland



Figuur 16 Ligging kunstnest zeearend



Figuur 17 Kokmeeuwkolonie vooroever Krammerse slikken



Figuur 18 Kokmeeuwkolonie vooroever Krammerse slikken