

**QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING
DORPSSTRAAT HAULE**

ATKB

| *buro bakker*



QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING DORPS- STRAAT HAULE

Kenmerk:	20221105
Versie:	Definitief
Datum:	5-12-2022
Auteur:	[REDACTED]
Projectleider:	[REDACTED]
Veldwerk:	[REDACTED]
Kwaliteitscontrole:	[REDACTED]
Opdrachtgever:	Woningstichting Actium
Contactpersoon:	[REDACTED]

Dit rapport is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud van de rapportage is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven.

© ATKB voor natuur en leefomgeving. Gebruik en overname van gegevens alleen toegestaan met volledige bronvermelding.
Foto's: ATKB, Aaron Sibma

ATKB ASSEN
STATIONSSTRAAT 29C
9401 KW ASSEN

ATKB MIDDELHARNIS
PRINS BERNHARDLAAN 147
3241 TA MIDDELHARNIS

ATKB WAARDENBURG
KOEWEISTRAAT 7
4181 CD WAARDENBURG

ATKB ZOETERMEER
LOUIS BRAILLELAAN 100
2719 EK ZOETERMEER

KVK 27 1771 40
BTW NL 8076 36 757B01
IBAN NL53 RABO 0160177529

INHOUD

1.	Inleiding	1
1.1	Aanleiding en doel	1
1.2	Wettelijk kader	1
1.3	Onderzoeksmethode	2
1.4	Ligging en beschrijving plangebied	2
1.5	Gebiedsbescherming	3
1.6	Planbeschrijving	4
2.	Resultaten en effecten	6
2.1	Vogelrichtlijnsoorten	6
2.2	Habitatrichtlijnsoorten	8
2.3	Nationaal (Andere) beschermde dier- en plantensoorten	11
3.	Conclusie	13
3.1	Conclusie beschermde soorten	13
3.2	Benodigde vervolgstappen	13
4.	Literatuur en bronnen	14

I. INLEIDING

I.1 AANLEIDING EN DOEL

Dorpsbelangen wil in samenwerking met Stichting Actium tien woningen laten bouwen aan weerskanten van de inrit van Dorpstraat 14. Vier van deze woningen worden verhuurd door Actium.

Door de ontwikkeling kunnen effecten op beschermde soorten op voorhand niet worden uitgesloten. Actium heeft ons gevraagd om de ontwikkeling te toetsen aan het onderdeel soortenbescherming van de Wet natuurbescherming. Vanwege de afstand tot beschermde natuurgebieden is een uitgebreide toetsing aan het onderdeel gebiedsbescherming niet aan de orde (zie ook par. 1.5).

Deze quickscan geeft antwoord op de volgende vragen:

- Welke beschermde flora en fauna zijn aanwezig of kunnen in het plangebied en omgeving voorkomen?
- Kunnen de geplande werkzaamheden negatieve effecten hebben op beschermde flora en fauna?
- Zo ja, welke effecten kunnen optreden en welke maatregelen zijn dan nodig om deze negatieve effecten te voorkomen?
- Indien overtreding van de Wet natuurbescherming niet volledig te vermijden is, welke vervolgstappen zijn dan aan de orde?

I.2 WETTELIJK KADER

Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet opgegaan in één nieuwe wet: de Wet natuurbescherming (Wnb). Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming betreft het onderdeel soorten, voorheen de Flora- en faunawet. Met deze quickscan vindt de toetsing aan het onderdeel soorten van de Wet natuurbescherming plaats.

In de Wet natuurbescherming worden drie beschermingsregimes onderscheiden:

1. Vogelrichtlijnsoorten (artikel 3.1 - 3.4)
2. Habitatrichtlijnsoorten en soorten genoemd in de Verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5 - 3.9)
3. Andere soorten (artikel 3.10 - 3.11; bijlage onderdeel A en B)

De lijst 'jaarrond beschermde nesten' die onder de Flora- en faunawet is opgesteld, is ook onder de Wnb geldig. Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als onder de Flora- en faunawet, de zorgplicht (artikel 1.11) voor alle in het wild levende dieren.

Voor dit project is de provincie Groningen het bevoegd gezag voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming en voor het verlenen van een eventuele ontheffing. De provincie Groningen heeft voor de implementatie van de Wet natuurbescherming een verordening vastgesteld. Hierin is onder meer de lijst met vrijgestelde soorten te vinden.

I.3 ONDERZOEKSMETHODE

Voor het bepalen van de mogelijke effecten van de geplande werkzaamheden is het noodzakelijk te weten welke beschermde soorten aanwezig zijn en kunnen zijn, in en in de omgeving van het plangebied. Hiervoor is bronnenonderzoek gedaan en is een veldbezoek uitgevoerd.

Bronnenonderzoek

Het bronnenonderzoek bestaat uit het raadplegen van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, geraadpleegd in september 2022) en vrij beschikbare verspreidingsgegevens van beschermde soorten flora en fauna. Hiervoor zijn de meest actuele en relevante bronnen geraadpleegd (zie ook hoofdstuk 4).

Veldonderzoek

Op 13 september 2022 is een verkenning in het plangebied en de directe omgeving (onderzoeksgebied) uitgevoerd door een ecooloog van ATKB | Buro Bakker. Tijdens dit veldbezoek is een beoordeling gemaakt van het plangebied als geschikt leefgebied voor beschermde flora en fauna. Tevens zijn de waargenomen beschermde soorten genoteerd.

I.4 LIGGING EN BESCHRIJVING PLANGEBIED

Het plangebied betreft twee delen van een raaigrasland aan de Dorpsstraat. De bouwvlakken zijn ongeveer 60 x 40 meter en liggen aan weerskanten van de oprit van Dorpsstraat 14. (figuur 1).



Figuur 1. De twee plangebiedjes aan weerskanten van de oprit naar Dorpsstraat 14

Beide bouwvlakken liggen in een raaigrasland en worden aan de noordzijde begrensd door een (droge) greppel en De dorpsstraat. Aan weerskanten van de toekomstige bouwvlakken zijn andere erven van de lintbebouwing van Haule aanwezig. Tussen de beide bouwvlakken ligt een verharde en onverharde inrit van Dorpsstraat 14.

Onderstaande foto's geven een impressie van het plangebied.



Foto 1 Het oostelijke deel van het plangebied



Foto 2 Het westelijk deel van het plangebied.



Foto 3 De Dorpsstraat.



Foto 4 De verharde inrit naar Dorpsstraat 14

1.5 GEBIEDSBESCHERMING

Natura 2000

De Wet natuurbescherming vereist dat beoordeeld wordt of de ontwikkelingen gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Hiervoor kan een voortoets nodig zijn. Als uit de voortoets blijkt dat significant negatieve effecten op de doelstellingen van Natura 2000-gebied(en) niet kunnen worden uitgesloten moet een vervolgonderzoek in de vorm van een passende beoordeling plaatsvinden en is een vergunningaanvraag noodzakelijk.

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het Fochteloërveen op ongeveer 4,2 km afstand gevolgd door het Bakkeveen op ongeveer 5,2 km afstand van het plangebied.

Gezien de afstand tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn direct negatieve effecten door de werkzaamheden als gevolg van licht, geluid, verstoring door mensen en materieel, etc. niet aan de orde. Een nadere toetsing is voor deze storingsfactoren niet nodig.

Stikstofdepositie


Projecten met stikstofemissie kunnen door een toename in stikstofdepositie een significant negatief effect op de doelstellingen van Natura 2000-gebieden veroorzaken. Een berekening van de AERIUS Calculator maakt duidelijk of een project een toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden veroorzaakt. Er is sprake van een vergunningplicht wanneer de stikstofdepositie hoger is dan 0,00 mol/ha/j.

Partiele vrijstelling aanlegfase

Er geldt een partiële vrijstelling voor de bouw, aanleg en sloop (de zgn. aanlegfase) voor stikstofdepositie. De vrijstelling is partieel, omdat deze alleen geldt voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw, sloop en aanleg en niet voor de structurele stikstofemissies in de gebruiksfase. Dit betekent dat een depositieberekening van de aanlegfase niet verplicht is. Wanneer u geen depositieberekening voor de aanlegfase uitvoert, betekent dit automatisch dat u een beroep doet op de partiële vrijstelling.

Gebruiksfase

We raden aan, gezien de scope van de werkzaamheden, om een AERIUS-berekening van de stikstofdepositie te (laten) maken voor de gebruiksfase.



Figuur 2. De ligging van Natura 2000-gebieden (groen) ten opzichte van Haule (rode ster)

1.6 PLANBESCHRIJVING

Dorpsbelangen wil in samenwerking met Stichting Actium tien woningen laten bouwen aan weerskanten van de inrit van Dorpstraat 14. Vier van deze woningen worden verhuurd door Actium.

Het plangebied zal eerst bouwrijp gemaakt worden en er zal ergens een bouwdepot en keet worden geplaatst. Waar en wanneer dit plaatsvindt is onbekend. Daarna start de bouw.

2. RESULTATEN EN EFFECTEN

Dit hoofdstuk beschrijft het (mogelijke) voorkomen van beschermde flora en fauna. Per beschermingsregime zijn de effecten beschreven en getoetst aan de Wet natuurbescherming. Vervolgens zijn de eventuele vervolgstappen aangegeven. In dit hoofdstuk is een onderscheid gemaakt in Vogelrichtlijnsoorten (paragraaf 2.1), Habitatrichtlijnsoorten (paragraaf 2.2) en nationaal beschermde soorten (paragraaf 2.3).

2.1 VOGELRICHTLIJNSOORTEN

Aanwezige soorten

Vogels met jaarrond beschermde nesten

Een aantal vogels hebben nesten met een jaarrond beschermde status omdat de vogelsoorten het gehele jaar gebruik maken van het nest, geen eigen nesten bouwen (en dus niet gemakkelijk een nieuw nest kunnen maken) of in kolonieverband broeden. De meeste soorten vogels met jaarrond beschermde nesten zijn roofvogels en uilen, maar ook de in gebouwen broedende gierzwaluw en huismus hebben nesten die jaarrond zijn beschermd.

Uit bronnenonderzoek blijkt de aanwezigheid van een aantal soorten vogels met jaarrond beschermde nesten nabij het plangebied. In een straal van 500 meter rondom het plangebied zijn buizerd, huismus, gierzwaluw, ooievaar, roek, sperwer en ransuil waargenomen (NDFF, 2022). In het plangebied ontbreekt geschikte broedgelegenheid voor vogels met jaarrond beschermde nesten. Hieronder wordt voor de drie bovengenoemde soorten omschreven waarom het plangebied niet geschikt is.

Buizerd

Tijdens het veldbezoek is een buizerd waargenomen op een afstand van ongeveer 100 meter van het plangebied in de houtsingel ten westen van de ijsbaan.

In de houtsingels om de ijsbaan en het bosje ten noorden en westen van de ijsbaan zijn meerdere waarnemingen van buizerd gedaan waaronder territorium indicerende waarnemingen (NDFF, 2022). De kans is groot dat hier ook gebroed wordt. Naar verwachting is er tussen 250 m en 500 m ten noorden of noordwesten van het plangebied een nest aanwezig. In het plangebied zelf zijn geen bomen aanwezig en zijn geen mogelijkheden voor een broedlocatie.

Sperwer

Er zijn meerder waarnemingen gedaan van jagende sperwers in de omgeving van de Claes Egbesweg (NDFF, 2022). Een nestlocatie is niet bekend, maar kan wel in die omgeving in de grotere tuinen met bosjes aanwezig zijn. Dit is op ruim 160 meter van het plangebied. Ook rond de ijsbaan zijn mogelijkheden voor nestlocaties van de sperwer.

Ransuilen

Op het erf van Dorpsstraat 14 zijn in 2017 roepende jonge ransuilen waargenomen. Ook in 2020 zijn roepende jonge ransuilen waargenomen in de tuin van Dorpsstraat 34 (NDFF, 2022).

Ransuilen maken vooral gebruik van naaldbomen om in te broeden maar af en toe ook in loofbomen. In het plangebied zijn geen bomen aanwezig. In de direct omgeving zijn wel bomen en bosjes aanwezig waar de soort kan broeden.

In de omgeving van het plangebied is waarschijnlijk een nestlocatie aanwezig. Daarnaast zijn er ook enkele waarnemingen van roestplaatsen in de omgeving. Roestplaatsen zijn rustplaatsen die worden gebruikt

door overwinterende ransuilen. Hiervoor gebruiken ransuilen bij voorkeur groenblijvende bomen en/of heesters.

Ooievaar

In de omgeving zijn waarnemingen van ooievaars bekend (NDFF, 2022). Ooievaars kunnen grote afstanden afleggen vanaf de nestlocatie op zoek naar voedsel. Tijdens het veldbezoek zijn geen ooievaarsnesten waargenomen. In de omgeving kunnen deze wel aanwezig zijn. In het plangebied zelf ontbreken mogelijkheden voor een nest.

Huismus

Tijdens het veldbezoek zijn meerdere huismussen waargenomen op het erf van Dorpsstraat 14 en 12. De huismus komt veel voor in de omgeving (NDFF, 2022). Het plangebied zelf is niet geschikt voor huismussen om in te broeden omdat nestgelegenheid ontbreekt. Zo ontbreekt bebouwing en zijn er geen nestkasten.

Gierzwaluw

In de omgeving zijn enkele waarnemingen gedaan van de gierzwaluw (NDFF, 2022). Door het ontbreken van bebouwing in het plangebied ontbreekt het aan nestgelegenheid.

Roek

In de omgeving zijn waarnemingen bekend van foeragerende roeken. Nestlocaties zijn niet ingevoerd (NDFF, 2022). In het plangebied zijn geen bomen aanwezig waar roeken in kunnen broeden. Tijdens het veldbezoek zijn in de directe omgeving geen kolonies waargenomen.

Categorie 5 broedvogels

De zogenaamde Categorie 5-soorten zijn vogelsoorten waarvan de nesten niet standaard jaarrond beschermd zijn omdat ze meer flexibel zijn in het vinden van een nestplaats dan vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest. Onder bepaalde ecologische omstandigheden kunnen deze nesten wel een jaar-ronde bescherming hebben. Voorbeelden van categorie 5-soorten zijn boerenzwaluw, huiszwaluw, koolmees, pimpelmees en spreeuw.

Tijdens het veldbezoek zijn de soorten koolmees, boomkruiper en boerenzwaluw waargenomen. In de omgeving zijn ook de soorten spreeuw en huiszwaluw bekend (NDFF).

In het plangebied is geen geschikte broedgelegenheid aanwezig voor categorie 5-soorten.

In de singels en bosjes rond de ijsbaan kunnen soorten als boomkruiper, koolmees en pimpelmees tot broeden komen. In de schuren van boerderijen in de omgeving kunnen boerenzwaluwen broeden en aan woningen in de omgeving kan de huiszwaluw broeden.

Spreeuwen kunnen zowel in woningen als bomen met holtes in de omgeving broeden.

Overige broedvogels

In het plangebied ontbreekt geschikte broedgelegenheid voor algemene broedvogels. In het plangebied is onvoldoende dekking voor nestelende vogels. In de directe omgeving is wel geschikte broedgelegenheid aanwezig. Dit betreft vooral de bosrijke omgeving van de schaatsbaan, de tuinen in de omgeving en de struiken langs de oprit van Dorpsstraat 14. Hier kunnen algemene soorten broeden zoals merel, tijtjaf, vink, roodborst, houtduif en zwartkop.

Effecten en vervolg

Vogels met jaarrond beschermde nesten

In het plangebied zijn geen vogels met jaarrond beschermde nesten aanwezig. In de directe omgeving zijn wel soorten als huismus en ransuil aanwezig. De werkzaamheden hebben geen invloed op broedende huismussen of ransuil in de omgeving. Ook de andere soorten die voorkomen op enige afstand zoals buizerd rond de ijsbaan ondervinden geen verstoring door de werkzaamheden.

Omdat effecten kunnen worden uitgesloten zijn vervolgstappen niet aan de orde.

Categorie-5 vogelsoorten

In het plangebied broeden geen categorie 5-soorten.

In de tegenoverliggende bosrijke omgeving rond de schaatsbaan en aangrenzende tuinen kunnen wel enkele categorie 5-soorten tot broeden komen. Met de bouw van de woningen blijft de omgeving geschikt als broedgebied voor deze soorten. De bouwwerkzaamheden leiden mogelijk tot een geringe verstoring van de vogels die in de omgeving broeden. De effecten zijn minimaal en tijdelijk van aard. Vervolgstappen zijn niet aan de orde.

Overige broedvogels

Het plangebied zelf biedt geen geschikte broedgelegenheid voor overige (algemene) soorten broedvogels. Wel kunnen de werkzaamheden een verstorend effect hebben op vogels die vlak naast het plangebied broeden zoals in de struiken lange de oprit van Dorpsstraat 14 of in de groene erfbegrenzing van Dorpsstraat 12 of 16.

Effecten op broedvogels zijn eenvoudig te voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. De beste periode voor de werkzaamheden is september tot en met februari.

Ook is het mogelijk om effecten uit te sluiten indien de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden opgestart. Vogels die zich dan in de omgeving vestigen zijn niet gevoelig voor verstoring. Vervolgstappen zijn dan niet aan de orde.

2.2 HABITATRICHTLIJNSOORTEN

2.2.1 PLANTEN

Aanwezige soorten

Er zijn vier planten beschermd onder de Habitatrichtlijn (HR), te weten: drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm en zomerschroeforchis. Deze soorten komen alleen in zeer specifieke milieus voor en zijn afhankelijk van kalkrijke, voedselarme en vochtige tot natte omstandigheden met kwelinvloed. De beschermde planten van de Habitatrichtlijn eisen voedselarme en extensief beheerde omstandigheden. In het plangebied ontbreken deze omstandigheden waardoor het ongeschikt is voor planten van de Habitatrichtlijn.

Ook zijn geen waarnemingen van beschermde soorten bekend binnen het plangebied en omgeving (NDDF 2022). Het is dus uitgesloten dat beschermde planten van de Habitatrichtlijn voorkomen in het plangebied.

Effecten en vervolg

Vanwege het ontbreken van geschikte groeiplaatsen in het plangebied, zijn negatieve effecten uitgesloten.

2.2.2 VLEERMUIZEN

Aanwezige soorten

Uit bronnenonderzoek blijkt het voorkomen van een groep overwinterende gewone grootoorvleermuizen op zolder van de basisschool de Manden aan de Dorpsstraat 45 (NDFF 2022). Dit is op een afstand van ongeveer 450 meter van het plangebied. Wat verder op in de hervormde kerk worden jaarlijks overwinterende gewone grootoorvleermuizen geteld (NDFF, 2022). Dit is op een afstand van ongeveer 1 kilometer van het plangebied.

Andere soorten die in de omgeving te verwachten zijn bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Deze soorten zijn gebouwbewonende soorten die prima in de woningen in Haule kunnen verblijven. Ook de rosse vleermuis kan in de omgeving voorkomen. Deze soort verblijft meestal in holtes in bomen.

Verblijfplaatsen

In het plangebied is de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen op voorhand uit te sluiten. Er zijn geen gebouwen of bomen met geschikte holtes aanwezig. In de woningen van aangrenzende percelen kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Ook in grotere bomen in de omgeving kunnen holtes aanwezig zijn die geschikt zijn voor vleermuizen.

Essentiële vliegroutes

Essentiële vliegroutes, die verblijfplaatsen en foerageergebied verbinden, bestaan uit lijnvormige structuren, zoals bomenrijen en watergangen. Het plangebied bevat dit soort structuren niet.


De bomensingel langs de Dorpsstraat maakt deel uit van een doorgaand lijnvormig element. Echter de verlichting langs de Dorpsstraat straalt alle kanten op waardoor lichtschuwe soorten als de gewone grootoorvleermuis er weinig langs zullen vliegen of bijvoorbeeld een alternatieve route kiezen achter de huizen langs.

Ook dwars op de Dorpsstraat zijn er nog een aantal (donkere) singels aanwezig (relicten van een coulisselandschap) die een belangrijke rol kunnen spelen als vliegroutes voor bijvoorbeeld de gewone grootoorvleermuizen in de omgeving of de te verwachten gewone dwergvleermuis (zie Figuur 1).

Essentieel foerageergebied

Vleermuizen maken gebruik van diverse groenelementen zoals tuinen, bomenrijen, luwte van gebouwen en parken om hun voedsel (insecten) te vangen. Het plangebied bestaat uit Engels raaigraspercelen waar relatief weinig insecten op afkomen. Het plangebied zal geen essentieel foerageergebied zijn.

Het gebied rond de ijsbaan en de groenere tuinen zijn veel geschikter foerageergebied voor vleermuizen (zie Figuur 2).



Figuur 1 Mogelijke vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen in de omgeving van het plangebied.

Effecten en vervolg

In het plangebied is geen sprake van de aanwezigheid van verblijfplaatsen, essentiële vliegroutes en essentieel foerageergebied. De bouw van de woningen heeft geen effect op vleermuizen die in de omgeving verblijven, foerageren of zich verplaatsen. Vervolgstappen zijn niet aan de orde.

2.2.3 GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN

Aanwezige beschermde soorten

Relevante grondgebonden zoogdieren die zijn beschermd onder de Habitatrichtlijn zijn bever, otter en noordse woelmuis. In het plangebied is geen geschikt leefgebied aanwezig voor deze soorten.

Effecten en vervolg

De aanwezigheid van beschermde zoogdieren van de Habitatrichtlijn is uit te sluiten. Vervolgstappen zijn zodoende niet aan de orde.

2.2.4 REPTIELEN EN AMFIBIEËN

Aanwezige beschermde soorten

Uit bronnenonderzoek zijn de poelkikker (1,4 km) en de heikikker (1 km) bekend (NDFF, 2022).

Beide beschermde soorten komen voor in de natuurgebieden Blauwe bos en Haulerpolder.

Het plangebied bestaat uit raaigraspercelen die ongeschikt zijn voor beide kritische soorten.

De greppel aan de noordzijde van het plangebied is vaker droog dan nat en heeft steile oevers en is daardoor niet geschikt als voortplantingswater voor amfibieën.

Effecten en vervolg

De aanwezigheid van reptielen en amfibieën kan worden uitgesloten. Vervolgstappen zijn zodoende niet aan de orde.

2.2.5 VISSSEN, INSECTEN EN ONGEWERVELDEN

Aanwezige beschermde soorten

Bij de vennetjes in het Blauwe bos en in de Haulerpolder komt de gevlekte witsnuitlibel voor. Dit is op een afstand van ongeveer 1,4 km van het plangebied. De soort is kritisch en komt voor in verlandingszones van laagveenmoerassen. Daarnaast kunnen ze voorkomen in bosplassen en verlandingszones van hoogveen- en heidevennen op de hoge zandgronden en randzones van hoogveen. In de duinen is de soort gevonden bij verlandingsvegetaties met een laagveenkarakter. Deze biotooptypen hebben met elkaar gemeen dat het water helder, ondiep (één meter of minder), matig voedselrijk en beschermd gelegen is. De soort is niet in of vlak bij het plangebied te verwachten aangezien er sprake is van voedselrijke raaigraslanden met droogstaande of vermeste greppels en sloten.

De aanwezigheid van andere beschermde vissen, insecten en ongewervelden is uit te sluiten. Dit omdat omstandigheden zoals aanwezigheid van geschikte vegetatie, vennetjes e.d. ontbreken binnen het plangebied.

Effecten en vervolg

Vanwege het ontbreken van waarnemingen en geschikte omstandigheden voor beschermde insecten en ongewervelden, zijn effecten uitgesloten en vervolgstappen niet aan de orde.

2.3 NATIONAAL (ANDERE) BESCHERMDE DIER- EN PLANTENSOORTEN

Bronnenonderzoek

In de omgeving zijn waarnemingen van adder en levendbarende hagedis bekend. De waarnemingen zijn afkomstig uit het Blauwe bos. Dit is een open (naald)bos en heidegebied met vennetjes op een afstand van ongeveer 1 km ten noorden van het plangebied.

Het plangebied heeft een totaal ander habitat (raaigras) dat totaal ongeschikt is voor beide soorten reptielen.

In de omgeving zijn ook enkele waarnemingen van das bekend. De soort komt voor in het Blauwe bos en er zijn enkele waarnemingen bekend in een heel smal bosperceeltje langs de Fenneweg. Beide waarnemingen zijn op een afstand van meer dan 1 km van het plangebied. Het plangebied zelf is ongeschikt als leefgebied.

Het plangebied bestaat uit een sterk bemest raaigrasland dat regelmatig wordt gemaaid. Er zijn op een aantal veldmuizen en een enkele haas na nauwelijks dieren te verwachten. In de randen van de droge greppels kan de soort bosspitsmuis voorkomen.

In de aangrenzende tuinen kan de egel voorkomen. In het plangebied zelf zijn geen verblijfplaatsen maar kan de soort kortstondig foerageren.

Voor de overige nationaal beschermde grondgebonden zoogdieren en voor nationaal beschermde reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen en overige ongewervelden en planten ontbreekt geschikt leefgebied in het plangebied.

Effecten en vervolg

Op basis van de quickscan kunnen negatieve effecten op mogelijke verblijfplaatsen van egels uitgesloten worden. Vervolgstappen zijn niet aan de orde. De veldmuis kan leven in de beide percelen en met het bouwrijp maken van het perceel worden gedood of verwond. Deze soort is vrijgesteld in alle provincies. Verblijfplaatsen van de bosspitsmuis liggen waarschijnlijk net buiten het werkgebied en deze soort is ook vrijgesteld.

Wel is de zorgplicht van toepassing (Wet natuurbescherming artikel 1.11). De zorgplicht houdt in dat schade aan wilde planten en dieren zoveel, als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen.

3. CONCLUSIE

3.1 CONCLUSIE BESCHERMDE SOORTEN

Op basis van de quickscan zijn met betrekking tot de aanwezigheid van beschermde flora en fauna de volgende conclusies te trekken:

Vogelrichtlijnsoorten

- In het plangebied is geen geschikte broedgelegenheid aanwezig voor vogels. Alleen rond de ijsbaan en in de aangrenzende tuinen en struiken langs de oprit is geschikt broedgelegenheid aanwezig voor een aantal algemene broedvogels zoals merel, tjiftjaf, vink, roodborst, houtduif en zwartkop. Tijdens de quickscan zijn geen broedende vogels meer aangetroffen in de groenstrook.

Habitatrichtlijnsoorten

- In het plangebied is geen geschikt leefgebied aanwezig voor Habitatrichtlijnsoorten. In de directe omgeving (woonwijk) kunnen wel verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, maar deze worden niet beïnvloed door het voornemen.

Nationaal beschermde soorten

- Het plangebied wordt hooguit gebruikt als (kortstondig) foerageergebied voor een aantal nationaal beschermde soorten zoogdieren (haas en egel). Voor deze soorten is het plangebied geen essentieel onderdeel van hun leefgebied. Daarnaast kan de zeer algemeen voorkomende veldmuis voorkomen in de beide percelen.

3.2 BENODIGDE VERVOLGSTAPPEN

Vogelrichtlijn

- Effecten op broedvogels kunnen worden uitgesloten door buiten het broedseizoen de werkzaamheden uit te voeren. De beste periode voor de werkzaamheden is tussen september en eind februari.

Habitatrichtlijn

- Geen vervolgstappen noodzakelijk.

Nationaal beschermde soorten

- Voor alle soorten geldt de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat schade aan wilde planten en dieren zoveel, als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen.

Indien andere werkzaamheden dan die zijn genoemd in Hoofdstuk 1 gaan plaatsvinden, dienen ook deze ingrepen getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. De conclusies kunnen dan afwijken van de bovenstaande conclusies.

4. LITERATUUR EN BRONNEN

- BIJ12, 2022. Kennisdocument Huismus *Passer domesticus*, Versie 2.0 juli 2022.
- BIJ12, 2017. Kennisdocument Gewone dwergvleermuis, Versie 1.0 juli 2017.
- Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), geraadpleegd september 2022.

Websites

www.verspreidingsatlas.nl/planten
www.vogelbescherming.nl
www.zoogdiervereniging.nl
www.ravon.nl
www.vlinderstichting.nl
www.openstreetmap.org
www.natura2000.nl
www.google.nl/maps

