


PROTOCOL

STICHTING OPVANG NOACH

Opvangcentrum voor in het wild levende inheemse dieren.



Bezoekadres: Aaltenseweg 21a,

7025 C.J. Halle Nederland

T 0314-390027

KvK 09132608

Bank: Regio Silvolde reknr. NL04 RBRB 0983197296

www.opvangnoach.nl

info@opvangnoach.nl

RSIN/fisc. nr: 816267613

Januari 2017 (nieuwste versie)

1. Over het ontstaan van de opvang van inheemse wilde dieren.	4.
2. Inleiding.	6.
3. Het ophalen van dieren.	7.
4. Binnenkomst.	8.
5. Noodopvang.	9.
6. Belangrijke telefoonnummers.	10.
7. Bereikbaarheid.	11.
8. Aannee van dieren.	12.
9. Registratie.	13.
10. Algemeen onderzoek binnengekomen dieren.	14.
11. Huisvesting.	15.
12. Plattegrond.	18.
13. Hygiëne.	22.
14. Quarantaine regels.	23.
15. Dettol.	24.
16. Afval.	28.
17. Continuïteit.	29.
18. Andere dan onder de ontheffing vallende dieren.	30.
19. Voeding.	31.
20. Vitaminen en andere toevoegingen of spec. voedsel.	33.
21. Vogels en hun voeding.	34.
22. Verzorging van jonge vogels.	36.
23. Verzorging	39.
24. Vaak voorkomende problemen.	55.
25. Verzorging kleine zoogdieren.	58.
26. Eekhoorns.	60.
27. Egels.	62.

28. Konijnen en hazen.	67.
29. Marterachtigen.	69.
30. Reeën.	71.
31. Wilde zwijnen.	73.
32. Herten.	74.
33. Dassen.	75.
34. Vossen.	76.
35. Vleermuizen.	77.
36. Dierenarts en Medicijnenlijst.	78.
37. Zoönosen.	81.
38. Terug in de natuur.	83.
39. Euthanasie.	84.
40. Calamiteiten.	85.
41. Ontheffingen.	86.
42. Diploma	92.
43. Stichting.	93.
44. Uitreksel K.V.K.	104.
45. A.N.B.I. beschikking.	106.
46. K.G.B. keurmerk.	107.
47. Lijst van zoogdieren in Nederland.	109.
48. Lijst van zoogdieren in Europa.	115.
49. Lijst van vogels in Europa.	126.

1. Over het ontstaan van de opvang van inheemse wilde dieren.

Al van kinds af aan was ik {Petra} met dieren bezig op allerlei manieren .

In 1984 heb ik na de Havo de dieren EHBO en dierenverzorging gedaan en naast een andere baan veel vrijwilligers werk met dieren gedaan zoals op de dierenambulance en vele jaren op het roofvogelasiel.

Inmiddels had ik een betaalde baan op het reguliere asiel (honden, katten en andere huisdieren) maar er kwamen steeds meer dieren op mijn pad waar eigenlijk hier in de omgeving geen opvang voor was.

Dus langzaam groeide de opvang uit , toen nog in Silvolde en kwam er een officiële vergunning en naam, en een erkenning van de vogelbescherming. Stichting vogelasiel Silvolde waar ik later samen met mijn man Toon steeds meer vogels maar ook andere dieren opving.

Aangezien het roofvogel-egel asiel ging afbouwen met de opvang ook van de andere dieren kwamen er steeds meer bij ons terecht en moest alles dus goed geregeld worden.

Na een korte periode in Doetinchem hebben we in Halle een prima plek gevonden waar de inheemse niet gedomesticeerde dieren rustig kunnen opgroeien, revalideren enz.

De baan op het asiel heb ik er aan gegeven omdat de opvang thuis te veel tijd in beslag ging nemen en ik moest kiezen.

Onze naam omdat we niet meer in Silvolde zaten en een universele naam wilden die paste bij de opvang werd Noach, en sinds eind 2008 zelfs Stichting Opvang Noach omdat de naam vogelasiel de lading allang niet meer dekt.

Ook hebben we al een ontheffing voor alle in het wild levende zoogdieren aangevraagd en voldoen we aan het nieuwe protocol van het Ministerie. Op jaarbasis is het asiel uitgegroeid tot een opvang van zo'n 4000 dieren van mus, konijn, vos, reiger, steenmarter, en zijn we ook een van de opvangadressen van reeënopvang Nederland met uitzetrennen in Doetinchem en Vriezenveen.

Verder halen we zo nodig dieren op in onze regio maar ook van buiten de regio komen de particulieren en dierenambulances met slachtoffers naar ons toe.

De stichting bezit sinds 1 januari 2009 een auto.

We geven voorlichting op scholen en aan ambulance medewerkers enz. en proberen op geheel vrijwillige basis de boel draaiende te houden.

De inkomsten hier zijn dus giften en donaties van allerlei verenigingen en particulieren die zorgen dat we deze opvang kunnen blijven doen omdat het inmiddels zo omvangrijk is geworden dat dit alles niet meer alleen door onszelf te bekostigen is.

De Stichting is in het bezit van het KGB keurmerk en heeft een ANBI status. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met asielen en andere opvangcentra's zodat de kennis gedeeld wordt en dieren in gezelschap van soortgenoten kunnen komen zitten als dat nodig is .

Kortom er is nog al wat gebeurt in de laatste 20 jaar maar met veel plezier willen we de hulp aan deze dieren blijven geven zodat onnodig dierenleed wordt voorkomen en mensen weten dat zij bij evt. problemen met de dieren bij ons terecht kunnen.

Alle dieren gaan weer terug in hun natuurlijke omgeving, we bieden ze alleen de hulp voor de periode die nodig is om ze daarna hun vrijheid weer terug te geven. We proberen ze ook op te vangen en te revalideren in een natuurlijk mogelijke omgeving zo dat de kans van slagen bij het vrij laten zo groot mogelijk is. Mensen kunnen ons in principe 24 uur per dag 7 dagen per week bereiken. Tevens zijn we inmiddels een aantal jaren opslaghouder voor inheemse dieren voor het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland afd. Dienst Regelingen.

Petra Lesterade,
Beheer opvang "Noach"

Opgesteld: Januari 2012

Herzien : Januari 2017

2. Inleiding.

Er komt nogal wat kijken bij de opvang van inheemse niet gedomesticeerde dieren.

o.a.

- * de ontvangstruimte

- * de behandelkamer

- * de eerste opvang
- * een quarantaineruimte
- * verschillende binnen en buiten verblijven
- * uitwen rennen

Belangrijk zijn de manier waarop er gewerkt wordt, de volgorde en vooral het in de waarde laten van de dieren.

We werken hier met zo weinig mogelijk mensen om inprent gedrag van de dieren te voorkomen.

In het bij zijn van dieren wordt dan ook niet gepraat of anderszins onrust veroorzaakt.

Veel dieren zijn zeer stressgevoelig en hier moet zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden.

Er wordt gezorgd dat er een zo'n gevarieerd mogelijk menu aanwezig is voor de verschillende diersoorten.

Een aantal medicijnen zijn altijd op voorraad , dit geldt ook voor middelen tegen parasieten.



3. Het ophalen van dieren.

In de regio en soms in uitzonderlijke situaties halen we de dieren op als mensen ze niet kunnen , willen brengen. Dit gebeurt met de auto van de opvang , die daar voor ingericht en uitgerust is.

Alle spullen die gebruikt worden uit de auto moeten weer gereinigd teruggezet worden.

Mocht er wat gebruikt zijn dat op is of vervangen moet worden moet dat genoteerd of doorgegeven worden.

Zorg dat de gegevens van het dier zoals vindplaats enz. genoteerd worden zodat dit bij binnenkomst in de opvang verwerkt kan worden.



4. Binnenkomst.

De mensen die dieren komen brengen worden te allen tijde vriendelijk te woord gestaan en meegenomen naar de ontvangstruimte.

Hiervoor is het ontvangstruimte ingericht , de mensen kunnen daar plaatsnemen en we nemen het dier dan mee naar de **BEHANDELRUIMTE** waar bekeken wordt en een diagnose gesteld kan worden.

De mensen krijgen dan voorlichting en uitleg over het dier en de opvang en krijgen een folder mee naar huis. Als zij op de hoogte willen blijven over de gezondheid van het dier kunnen ze dat bij voorkeur per mail doen.

IN GEEN GEVAL WORDEN DE MENSEN MEEGENOMEN NAAR DE DIERENVERBLIJVEN OMDAT DE STRESS VOOR DE DIEREN TE HOOG IS !!!!!

Dit wordt na de uitleg meestal ook wel begrepen door de brengers.

Natuurlijk wordt dan ook meteen zoveel mogelijk gegevens over het dier genoteerd waaronder in ieder geval de vindplaats van het dier zodat de registratie goed verloopt.

Vanuit de behandelruimte en na evt. behandeling wordt het dier ondergebracht in een verblijf.

Dat kan een couveuse zijn, de quarantaine, enz. al naar gelang de situatie vereist.



5. Noodopvang.

Inmiddels hebben we de noodopvang gerealiseerd in de ontvangstruimte net buiten de poort een eindje van de weg.

Mochten we onverhoopt een keer niet thuis zijn dan staan daar benches, bakken, warmtekussentjes en handdoeken om dieren warm te houden klaar. Verder ligt er info, folders enz. Borden aan de weg geven dit duidelijk aan. Dierenambulances zijn hier ook van op de hoogte, en voor particulieren verwijzen we zondig hierheen als ze contact met ons opnemen.

Meestal worden we eerst telefonisch benaderd maar er wordt ook zo meerdere keren per dag gekeken of men een dier gebracht heeft zonder zich met de intercom te melden.

Er is een parkeerplaats aan de weg en een parkeerplek verderop op het terrein gecreeerd.

Niet in de buurt van de dieren.



6. Belangrijke telefoonnummers.

Opvang Noach: 0314-390027 of 06-12526768

Roofvogelasiel Barchem: 0573-251977

Herman Wisselink: 0315-330574

Carla Rietman: 06-20884260

Robert Porskamp 06-21807744

Dierenambulances:

Doetinchem; 06-13953322

Arnhem: 026-3644999

OverGelder: 0900-9991999

Nijmegen: 024-3550222

Politie; 0900 8844

Landelijk : 112

Dierenpolitie 144

Brandweer; 112

Huisarts: 0314-631246 Post : 0314-3298888

Dierenartsen :

DAP Zelhem : 0314-621272

DAP Doetinchem : 0314-324631

DAP Silv-Vars-Aal : 0315-395535

Landelijke Inspectie Dienst: 088 81 13 000 (van 09.00 tot 17.00 uur)

Dierverwaarlozing: 144

Opvangcentra St. Reeënopvang Nederland :

Bertus Kobes: 0546-564678 of 06-15026185

De Mikke :06-54990003 of 06-21977781

Posterholt: 0475-403755

Van Gaalen:035-6014335 of 06-54295197

Asiel Doetinchem :0314-324854

Amivedi : 0314-641423

Afval: 0544-395546

Graszoden: 0314-621021

7. Bereikbaarheid.

Telefonisch zijn we altijd bereikbaar.

Ons telefoonnummer 0314-390027 is aangesloten op een antwoordapparaat zodat men altijd in kan spreken en zo snel mogelijk terug gebeld wordt en het verwijst ook naar ons 06 nummer voor dringende gevallen.

Op 06-12526768 zijn wij altijd bereikbaar .

Men kan dus altijd contact met ons krijgen.

Aangezien mens en dier vaak onverwachts met elkaar in aanraking komen hanteren wij geen openingstijden.

Zo nodig kan men dus 24 uur per dag bij ons terecht !

We zijn gesloten voor publiek.

8. Aanneame van dieren.

We nemen alle dieren aan die onder onze ontheffing vallen mits ruimte, personele capaciteiten financiële middelen hiervoor aanwezig zijn of het dier moet een te hoog risico geven voor de medewerkers en /of andere aanwezige dieren.

Dieren die niet onder onze ontheffing vallen verwijzen we door naar een opvangcentrum met wel de benodigde ontheffing.

De binnen gekomen dieren worden allen geregistreerd en zijn vanaf dat moment middels het nummer van binnenkomst goed te volgen.

Verder werken wij zo nodig samen met het Roofvogelasiel in Barchem aangezien zij daar zeer gespecialiseerd zijn en houden we i.v.m. de opvang van reekalveren geregeld contact met de andere aangesloten opvangcentra's van Stichting Reeënopvang Nederland. Er zijn een heel aantal asielen-opvangcentra die in de toekomst een samenwerkingsverband af willen sluiten. Zij brengen n.l. momenteel al overal vandaan bepaalde diersoorten zoals bijv. o.a. vossen hierna toe. Wij werken zoveel mogelijk met andere centra's samen in belang van het dier.

9. Registratie.

We werken met een kaart systeem waarop genoteerd wordt :
datum–diersoort–geschatte leeftijd vindplaats en evt. verdere info.
Elk dier krijgt zo een nummer en is in het logboek zo nodig onder dit nummer te volgen mocht dit nodig zijn..
Op deze kaart worden ook de diagnose, wijze van behandelen en afloop (vrijlating, euthanasie enz.) bijgehouden.

Verder houden we een logboek bij waarin bijzonderheden genoteerd worden, die er zich die dag voorgedaan hebben.

Dit kunnen telefoontjes zijn, veranderingen in de gezondheidstoestand van dieren .alsmede toegediende medicijnen.

In de quarantaine en eerste opvang zullen op de verblijven van de jonge dieren kaarten hangen met nummer van binnenkomst waarop gewicht, en andere dingen mits nodig kunnen worden bijgehouden.

De kaarten worden verwerkt in een excel bestand. Dit ter registratie en terugmelding voor de vinder.

10. Algemeen onderzoek binnengekomen dieren.

Binnengekomen dieren worden geregistreerd en bekeken of ze spoedeisende hulp nodig hebben. Is dit niet het geval dan laten we het dier eerst zo nodig even bijkomen.

Veel stressgevoelige dieren hebben door de reis , het contact met mensen enz. al bijna te veel gekregen en het is niet de bedoeling dat hen dat al te veel gaat worden.

VERDER ONDERZOEK:

Waar moet op gelet worden !!

- zijn er botbreuken
- zijn er andere verwondingen
- maakt hij ongecontroleerde bewegingen
- heeft het dier een normale ademhaling
- is er ontlasting en hoe ziet die er dan uit
- zijn er zwellingen
- heeft het dier in vacht of veren last van parasieten
- bekijk anus of cloaca i.v.m. met bijv. diarree, maden
- is het verenpak beschadigd
- bekijk de slijmvliezen, neusgaten en keelholte
- zijn de ogen helder, en schoon
- controleer de reactie van de pupillen
- zijn reflexen aanwezig
- voel het dier op plekken warm aan
- maakt het dier vreemde geluiden bij het ademen
- ruikt het dier anders
- zitten er geen maden in wonden, oren enz.-ook madeneitjes moeten verwijderd worden
- is de stand van de vleugels normaal
- is het dier uitgedroogd of bijzonder mager

Het dier kan nabehandeling en evt. medicijn toediening in een geschikte ruimte gehuisvest worden.

Voor een aantal dieren zal dat de eerste 24 uur minimaal zo donker en rustig mogelijk zijn.

DE ONDERZOEKSTAFEL WORDT NA ELK ONDERZOEK ONTSMET SAMEN MET DE EVT. GEBRUIKTE INSTRUMENTEN, ALLES WORDT WEER OP DE PLEK TERUG GEZET !

11. Huisvesting.

In onze opvang zijn diverse mogelijkheden tot huisvesting:

- quarantaine met een couveuse
- eerste opvang met o.a. – 5 couveuses
 - 4 grote benches
 - 20 verschillende hokken
 - 4 bakken met warmtelamp
 - Bakken waar een warmtemat ingelegd kan worden
 - Verblijven voor raamslachtoffers enz.
 - Uitbreiding en aanpassing altijd mogelijk
- buitenverblijven; –2 met vijver waarvan 1 met nachthok, beiden mogelijkheden voor het aansluiten van een of meerdere warmte
 - de reeënren die in tweeën opgesplitst is maar ook simpel tot een grote ren gemaakt kan worden.
 - Heeft een nachthok met stroomvoorziening en camera toezicht. En een afdak, in beiden kunnen benches geplaatst worden.
 - 2 kleinere opvanghokken voor bijv. aangereden roofdieren met een afkoppelbaar
 - Nachthok zodat als ze snel bijkomen ze zo met nachthok en al vervoerd kunnen worden.
 - metalen verblijf voor marterachtigen, vossen, dassen enz. Werkt ook met kist die meteen als vervoerskist (nachthok) dient.
 - egolverblijven, Driehoeken met nachthokken, overwinteren is ook mogelijk.
 - 5 verblijven die gebruikt kunnen worden voor egels of konijnen
 - Een ren met nachthok en kist, die vooral in gebruik is voor

konijnen, maar soms de wat kleinere hazen. (grotere kunnen ook in de reeënren).

Ook hier kunnen ze met kist en al verhuist worden.

- De grootste metalen rennen, worden gebruikt meestal voor vossen, dassen enz.
Weer met nachthok met schuif sijsteem voor het uitzetten.
Ook deze ren is multifunctioneel en ook zeer geschikt voor grotere vogels
- ren dubbelgaas, opsplitsbaar in 2 gedeeltes. Deze ren meestal gebruikt voor eekhoortjes is ook zeer geschikt voor zangvogels omdat zij hier beschermt zijn voor stootvogels en katten. Beschikt ook over uitneembare nachtkasten.
- wederom een verblijf van 6 bij 3 met nachthok groot eraan waar meestal zangvogels, maar ook duiven of andere vogels, dieren al naar gelang behoefte gehuisvest kunnen worden.
- dit verblijf met nachthok op poten is zeer geschikt voor uilen maar ook kraaien, Vlaamse gaaien enz.. Door grote surrogaat nesten te bouwen kunnen ze vanuit het nachthok op stokken vliegen.
- aan de achterkant is er nog een klein verblijf voor zangvogeltjes.
- een kleinere dubbelgaas ren voor roofdieren of eekhoorns.
- een houten dierenverblijf met diverse benodigdheden.
- alle verblijven zijn zo nodig aan de buitenkant aangeplant en/of voorzien van rietmatten.
- en een wild zwijnen ren,
- 3 metalen functionele rennen,
- 2 metalen verblijven voor marterachtigen
- 1 groot verblijf voor roofvogels en of uilen,
- 1 ooievaarsverblijf met uitloop en nest.


ALLE HOKKEN ZIJN VOOR DIVERSE DIERSOORTEN BRUIKBAAR AL NAAR GELANG SEIZOEN, BEHOEFTE EN AANBOD, ZIJN ZIJ MULTI-FUNCTIONEEL.

Daardoor is het opvangen van een groot aantal dieren mogelijk

De rennen zijn omgeven door beplanting en er zijn genoeg schuil mogelijkheden en kansen om natuurlijk gedrag te vertonen. Verder is het dier in een verblijf te plaatsen die aansluit bij zijn conditie en omstandigheden. Bezoekers komen niet bij de rennen hier dus dat scheelt ook al enorm. Alles is zodanig doordacht en gemaakt dat er voor de dieren en voor ons zo min mogelijk stress en gevaar is..

Ten allen tijde is het in de opvang op verschillende wijzen mogelijk zieke dieren apart te huisvesten.

Dit zij wel in de afzonderingsruimte als wel ergens anders in een verblijf, veel van de buitenrennen zijn ook voorzien van nachthok met stroom, licht enz. Er kunnen dus warmte voorzieningen en camera's aangesloten worden.



12. Plattegrond.

- 1 = Behandelkamer
- 2 = Eerste Opvang
- 3 = Quarantaine - Afzonderingsruimte
- 4 = Voerhok
- 5 = Ontvangstruimte
- 6 = Watervogel verblijf
- 7 = Reeënren
- 8 = Reeënren
- 9 = Grote (Roof)dieren verblijf
- 10 = Kleine roofdieren verblijf
- 11 = Eekhoorn verblijf
- 12 = Watervogel verblijf
- 13 = Egel verblijf
- 14 = Konijnen - Hazen verblijf
- 15 = Vossen - Dassen verblijf
- 16 = (roof) Vogel verblijf
- 17 = Vogel verblijf



18 = Wild zwijn verblijf

19 = Grote (roof)vogels – Uilen verblijf

20 = Roofdieren verblijf

21 = (grote) Vogel verblijf

22 = Noodopvang

23 = Roof dieren verblijf

24 = Volière

25 = Kippenren

26 = Ganzen nachthok

27 = Vijver

28 = Nachthok div.

29 = Uitvliegren

30 = Washok

31 = Meterkast

32 = Parkeerplaats

33 = Ooievaarsverblijf

34 = Buitenkeuken

35 = Veranda




36 = Opslag



= Ingang





Werken bij dit opvangcentrum houdt in dat je veel in contact komt met dieren uit het wild.

Deze dieren kunnen allerlei in en uitwendige parasieten bij zich dragen of virussen hebben

Die op mensen kunnen worden overgedragen, daarom is het dus belangrijk om voorzichtig en

Hygiënisch te werk te gaan.

We zorgen dat er altijd desinfecterende handsoap gebruikt wordt en de handen ook regelmatig

Gewassen worden.

Er is altijd dettol en andere ontsmettingsmiddelen aanwezig.

Zo nodig zijn er altijd verschillende soorten handschoenen en mondkapjes aanwezig.

Eventuele opgelopen wondjes worden gelijk gedesinfecteerd !!!!!

Zit nooit onnodig aan zieke dieren , dit is voor jezelf en voor het dier niet gewenst.

In de quarantaine trekken we de laarzen aan, en een overjas.

Zorg dat je na het vasthouden van een ziek dier eerst je handen wast of in ieder geval de handschoenen uitdoet.

Alle hokken worden goed schoongehouden en ook schoongemaakt zodra er geen dier meer in zit, zo komen alle dieren elke keer in een schoon hok.

Ook de buiten verblijven worden gereinigd naar behoefte als er dieren inzitten maar zeer goed gereinigd als ze leeg komen.

De graszoden, bodembedekking worden geregeld vervangen maar ook wanden, stokken, voerbakken en de watervoorzieningen worden geleeagd en gereinigd ,helemaal nadat de ren is vrijgekomen.

Alle gebruikte voorwerpen van behandeltafel, instrumenten, voer en waterbakken enz., worden goed gereinigd.

De potjes, speentjes, flesjes en benodigdheden van de zuigelingen worden geregeld uitgekookt.

We zijn er zeer attent op geen overlast door ongedierte te krijgen dus houden dat zeer scherp in de gaten en zorgen dat er dan meteen gepaste maatregelen getroffen worden (diervriendelijke).

Verder hebben we een aparte voedselruimte en zitten de voorraden in afgesloten tonnen.

14. Quarantaine regels.

In de quarantaine worden dieren geplaatst die verdacht worden van het hebben van een besmettelijke ziekte.

Bij binnenkomst worden zij daar meteen heengebracht en daar verder behandeld.

Als er dieren in de Quarantaine zitten dan komt daar alleen degene die verantwoordelijk is voor de verzorging en alleen ook als nodig is.

De Quarantaine wordt betreden met de speciale laarzen en een overjas, zo nodig worden handschoenen en een mondkapje gebruikt.

Als de omstandigheden zodanig ernstig zijn zal er een bak ontsmettingsmiddel geplaatst worden voor de ingang.

We nemen zo min mogelijk risico dus als er dieren zijn waarvan bij voorbaat al vast staat dat zij een groot gevaar voor andere dieren of mensen met zich mee brengt dan wordt er overgegaan op euthanasie.

In de Quarantaine worden elke dag de dierenverblijven ,de vloer en andere gebruikte voorwerpen ontsmet en zij blijven daar.

Als er na behandeling op advies van de dierenarts geen verbetering op treed dan zal het dier euthanaseert worden.

Mocht er calamiteiten op treden dan zal men zich moeten houden aan de vastgestelde regels.

In bijzondere gevallen als er geen zieke dieren in de Quarantaine zitten kan er gebruik gemaakt worden van deze ruimte om dieren in te huisvesten die bij veel rust gebaat zijn.

Vanzelfsprekend is dat zij eruit zouden moeten als er zich een ander quarantaine geval aangeboden wordt.

Op deze manier kan optimaal gebruik gemaakt worden van de ruimte.

15. Dettol.

Dettol

De werkzame stof in Dettol is chloorxylenol. **Chloorxylenol** is sinds vele jaren internationaal op de markt. Het is zonder recept verkrijgbaar onder

de merknaam Dettol. Het is verkrijgbaar als een geconcentreerde oplossing die voor gebruik moet worden verdund met water en dan kan worden gebruikt op de huid.

1. Wat doet Dettol en waarbij wordt het gebruikt?

Chloorxylenol is een ontsmettend middel. Het kan worden gebruikt om infecties van de huid en van wonden te voorkomen.

Huidinfectie

De huid kan met bacteriën besmet raken, vooral als er beschadigingen zijn, zoals bij eczeem, doorligwonden, snijwonden en scheerwondjes.

Chloorxylenol bestrijdt verschillende soorten bacteriën. Het maakt de celwand van deze bacteriën kapot waardoor ze afsterven. Bij **licht geïnfekteerde schaaf- of snijwonden** kunt u chloorxylenol gebruiken om de huid te ontsmetten.

Ook kunt u het middel gebruiken om **te voorkomen** dat er een infectie ontstaat of voor het ontsmetten van handen.

Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij huidinfectie

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Naast het gewenste effect kan Dettol bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn lichte irritatie en overgevoeligheid.

Zeer zelden

- **Lichte irritatie** van de huid. Dit gaat vanzelf over.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde

bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft Dettol een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen.

4. Als ik Dettol gebruik, mag ik dan...


autorijden, alcohol drinken en alles eten?

Bij Dettol zijn hiervoor geen beperkingen.

5. Kan ik Dettol gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

U kunt Dettol veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

6. Hoe moet ik Dettol gebruiken?



Kijk voor de juiste dosering in de bijsluiter of op het etiket van de apotheek.

Hoe?

- Verdun het middel eerst met water (meestal 1 deel lotion op 30 delen water) en breng het op de huid met een watje of schoon doekje.
- Vermijd contact met de ogen en laat het middel niet in de mond of neus komen, in verband met mogelijke irritatie. Als het toch in de ogen komt, spoel de ogen dan direct uit met water.

Wanneer?

Verdeel de behandelingen zo goed mogelijk over de dag. Dan heeft het middel een constant effect.

Hoe lang?

Langdurig gebruik op de huid wordt ontraden. Als Dettol niet werkt of als de aandoening zich uitbreidt, moet u contact opnemen met de arts.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Gebruik Dettol dan alsnog, tenzij het alweer bijna tijd is voor de volgende behandeling. Het heeft geen zin een dubbele hoeveelheid te gebruiken om iets in te halen. Eventueel kunt u uw schema iets verschuiven, maar zorg daarbij voor een gelijkmatige verdeling over de dag.

8. Kan ik zomaar met Dettol stoppen?

Als u het middel gebruikt om een geïnfecteerd wondje te behandelen kunt u beter niet zomaar stoppen. De kans bestaat dat niet alle bacteriën verdwenen zijn en dat de besmetting blijft bestaan of terugkeert. Verbeter het wondje zichtbaar, dan kunt u zonder meer stoppen.

Eigenschappen

Dettol heeft een snelle en aanhoudende bacteriëndodende werking ten opzichte van een groot aantal pathogene micro-organismen, zowel gram-positieve als gram-negatieve bacteriën, gisten en schimmels. Dettol behoudt de werkzaamheid in aanwezigheid van organisch materiaal of zeepresten. Dettol, in de aanbevolen verdunning, is bacteriëndodend en niet alleen bacteriëstatisch. Dettol is relatief niet toxisch. De orale giftigheid is gering. Overgevoeligheid voor Dettol komt vrijwel niet voor en lokale irritatie is zeldzaam. Dettol kan met water (fijne emulsie) en met alcohol (heldere oplossing) worden gemengd.

Indicaties en verdunning

Desinfectie voor de handen 3% in water.

Verwondingen 5% in water.

Chirurgie:

Aanhoudende bactericide werking 30% in water of alcohol.

Pre-operatieve huiddesinfectie 30% in water of alcohol.

Gynaecologie-verloskunde:

Desinfectie van de huid 5% in water.

Vulva toilet 3% in water.

Contra indicaties

Overgevoeligheid voor fenolische antiseptica.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Inhoud

100 ml, 500 ml en 1000 ml.

16. Afval.

Het verwerken van het afval gaat als volgt :

* Het wordt verzameld in zakken

* Gaat in de zak in de groene containers

* Als de containers bijna vol zijn worden de zakken
In de 1100 lt container gegooid en opgehaald op
donderdag door Remondis. Tel. 0544-395546

De afvalbakken worden regelmatig verschoond en de inhoud gaat met zak en al in een vuilniszak.

17. Continuïteit.

Mocht door wat voor een reden dan ook de beheerder wegvallen kan de taak worden overgenomen door haar man en de penningmeester die ook precies weet hoe het hier in zijn werk gaat.

In het verleden is al bewezen dat dit prima werkt.

Een van hen kan de leiding overnemen, maar dat kan ook zo nodig in samenspraak.

De secretaris die zelf voorheen een opvang heeft gehad zal te allen tijde bereid zijn hulp en zijn kennis aan te bieden, mocht dit nodig zijn.

Kortom we hopen niet dat het nodig zal zijn maar mocht het toch het geval zijn zitten we niet voor een gat gevangen.

Verder werken wij samen met verschillende opvangcentra en dierenambulances die zo nodig de dieren op kunnen vangen \ naar een ander opvangcentrum kunnen brengen.

Aangezien de opvang zich bij huis bevindt zal er altijd een mogelijkheid zijn de dieren in ieder geval tijdelijk te verzorgen en te huisvesten.



Financieel gezien zijn er afspraken met verschillende verenigingen enz. zodat de opvang in ieder geval verzekerd is van een groot aantal inkomsten, deze voorzien in ieder geval in het nodige voedsel, medicijnen enz.

Verder worden er allerlei activiteiten ontplooid om geld in het laatje te krijgen en zijn we steeds op zoek naar fondsen voor projecten.

18. Andere dan onder de ontheffing vallende dieren.

Tot op heden is het helaas nog steeds het geval geweest dat zich af en toe ook dieren aandienen die tussen wal en schip vallen.

Meestal gaat dit om dieren die ergens aangelopen of gevlogen zijn.

Voor de meeste dieren kunnen wij dan door verwijzen naar een asiel in de omgeving, dit geldt voor de meeste huisdieren.

Helaas zijn er voor o.a. exoten zoals hoenderachtige en volierevogeltjes niet altijd meteen een passende oplossing te vinden.

Aangezien er dan toch hulp geboden dient te worden , zullen deze dieren tijdelijk worden ondergebracht en gemeld worden bij de Amivedi zodat de eigenaar zich kan melden.

Mocht dit niet het geval zijn zoeken wij een goed tehuis voor deze dieren.

Dit is gelukkig tot op heden nog steeds zonder al te veel problemen gelukt.

Wel proberen we dit tot een minimum te beperken !!!!

Dat wil zeggen dat dit alleen gebeurt als het echt niet anders kan en er zich anders een onhoudbare situatie voor doet voor mens of dier.

Voorbeelden hiervan zijn dat men anders dreigt het dier om zeep te helpen of zonder pardon weer op straat te zetten.

Het moge duidelijk zijn dat dit allerm minst gewenst is !!!!

19. Voeding.

Lijst van altijd aanwezige voedselsoorten:

- Allerlei soorten melkpoeder, o.a. Esbilac, multimilk en Farmfood nr. 1
- Allerlei zaadmengsels en losse zaden om te mengen o.a. Zonnepitten, gemengd graan, maïs, tortelduivenzaad, volierezaad, wildzangzaad,
- Knaagdiermix, knabbelmix, hooi, stro, bedding enz.
- Universeelvoer, sivo-start, opfokvoer, eendenkorrels en graan.
- Hertenbrokken, eikels, beukennotjes, tamme kastanjes walnoten en ongepelde noten enz.
- Meelwormen, legmeel
- Sla, appels, witlof, wortelen
- Volkerenbiscuits, brood,
- Allerlei soorten vis, o.a. Spiering en sardientjes meestal ook garnalen.
- Eendagskuikens en postduiven.
- Katten\hondenbrokken en blikvoer
- Muizen
- Eieren
- Potjes babyvoeding

Verder zijn er altijd een aantal supplementen die we toevoegen aan de voeding zoals druivensuiker, Carmix, vitaminedruppels enz.

Om deze voeding aan te bieden zijn er natuurlijk de benodigde voederbakken, flesjes ,speentjes, spuitjes enz. . aanwezig.

De meeste voedingsvoorraad wordt opgeslagen in het speciale voerhok, in de diepvries of als het terplekke nodig is.


Het verstrekken van levend voedsel gebeurt alleen als dat nodig is voor de rehabilitatie van het dier zoals bijv. . het zeker moeten weten voor het vrijlaten dat het dier een prooi ook zelfstandig kan vangen, dit geldt vooral bij jonge dieren.

Natuurlijk wordt er vers water aangeboden maar dan wel op zo'n manier dat dit geen gevaar op levert voor het dier.

We streven ernaar een zo natuurlijk mogelijk voedsel aanbod te doen als het kan ook op een natuurlijke manier.

De rennen zijn soms voorzien van graszoden die geregeld vernieuwd worden. Ook daar waar nodig kunnen er stukken grasmat aangeboden worden als dit prettig of nodig is voor een dier.

Verder verzamelen we zo nodig,takken,grassen enz. in de omgeving.



20. Vitaminen en andere toevoegingen of spec. voedsel.

Druivensuiker : voor verzwakte dieren de eerste keren aan drinkwater of voedsel toevoegen

Ac3e druppels : als toevoeging op welke voeding dan ook als extra zo nodig

Kalktabletten : zo nodig extra geven

Carmix: Vitaminen en mineralen preparaat 2 % bij de voeding voorkomt ook tere botten

Hills A\D blikjes : als ze weinig eten

Royal canin : recovery na bijv. . een operatie.

21. Vogels en hun voeding.

Watervogels : Sivostart, groen, universeelvoer, meelwormen, gedroogde insecten in het water enz.

Later ook watervogelvoer, watervogelgraan, opfokmee, brood enz.

Viseters : Kleine visjes, garnalen, soms ook meelwormen, groen enz. Kan ook in water aangeboden worden.

Sommigen zullen gestopt moeten worden voor een tijd dat is per geval en soort verschillend.

Belangrijk is nooit te veel in een keer dan liever meerdere keren wat minder.

Hoeveelheden zijn ook niet precies aan te geven in het algemeen.

Aan het voedsel zo nodig extra vitaminen enz. toevoegen.

Zwaluwen : Meelwormen, kleine stukjes vlees, evt. wat geweekte brokjes met carmix.

Gierzwaluwen altijd voeden en bij de andere soorten kunnen ook voedsel in platte bakjes aangeboden worden, gew. brokjes , insecten (paté) en meelwormen.

Spechten : jonge dieren ook weer geen levende insecten voeren als zij zelf gaan eten is dat prima, voeding universeelvoer, meelwormen, insecten, fruit, pindakaas en geweekte brokjes.

Roofvogels : Stukjes borstvlees, eendagskuikens, muizen, meelwormen al naar omstandigheden wel of niet klein gesneden.

De eerste tijd moeten ze gestopt worden en al snel zullen ze zelf gaan azen.

Carmix toevoegen, ongeveer een theelepel per kuiken.

Duiven : Geweekt graan met evt. wat geweekte brokjes tussendoor.

Graan weken met eivoer en universeelvoer erdoor.
Krop niet te vol stoppen.

Kraaiachtigen : Universeelvoer, geweekte brokjes, fruit granen, kattenvoer, insecten enz.

Verder als ze klein zijn vochtig maken wat carmix en eivoer toevoegen.

Af en toe een ei, gekookt of rauw enz.

Kleine insectenetertjes zoals mezen en winterkoninkjes :

Meelwormen, universeelvoer, geweekte brokjes, insectenpaté, sivostart enz. rupsjes, buffalowormpjes

Hele jonge dieren zijn ook goed te voeden met kleine reepjes borstvlees met carmix.

Merels lijsters en spreeuwen : Zie kleine insecten eters alleen wat meer hoeveelheden.

Deze insecten eters moeten in verhouding vaker gevoed worden zeker als ze heel klein zijn.

Mussen , vinken enz. : combinatie voeding maar ook geweekte brokjes, borstvlees, universeelvoer en ga zo maar door , ook af en toe wat geweekte vezels.

Weide vogels : allerlei soorten insecten , regenwormen, sivostart, insectenpaté enz. met carmix.

Algemeen belangrijk is dat zo snel het kan een zo natuurlijk mogelijk voedsel op een zo natuurlijk mogelijke manier aangeboden wordt.

Knoei niet met voeden dat gaat ten koste van het verenpak, ook water aanbieden in lage schaaltes.

De vogels zijn gebaat bij een afstandelijke houding, en denk er om zien eten doet eten.

22. Verzorging van jonge vogels.

Hele jonge vogels, kaal ,in het dons of als ze onderkoeld zijn gaan ook in de couveuse ,onder de warmtelamp of op een warmte matje.

De warmte die ze nodig hebben ligt natuurlijk aan de omstandigheden, te warm is ook niet goed !

Iets oudere vogels kunnen in een bak met hooi, stro of ander materiaal zodat je een nest nabootst.

Een is er geen dus zo nodig een spiegel bijzetten maar meerdere samen is het mooist als dat mogelijk is.

Voor watervogels , weidevogels enz. maak je in een warme omgeving een plekje met hooi , een laag schaalte water ,strooit voedsel en geeft af en toe wat eten aan als ze nog niet zelf eten.

Ook groenvoer is onontbeerlijk. (Stuk graspol, gesneden groen)

Veel soorten zullen langere tijd meerdere keren per dag gevoed moeten worden.

Dit is per soort en leeftijd verschillend, bied altijd bijtijds ook natuurlijk voedsel aan zodat als ze willen ze zelf kunnen pikken.

Geef dat kleine grut geen levende meelwormen, kunnen te agressief zijn ,ook nooit te veel.

Overvoeden is sowieso erg slecht !

Stop de kropjes ook niet te vol in een keer.

Ook hier bouwen we de temperatuur geleidelijk af, alsmede het aanpassen van de geschikte verblijven. Alles gaat stapsgewijs.

In de buiten verblijven zitten ook gedeeltelijk warmte lampen die als het nodig zijn gebruikt kunnen worden ook voor overgangen van binnen naar buiten of dag en nacht.

Langzaam zullen zij steeds meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen en zich voorbereiden op de terugkeer in de natuur.

Sommige wat oudere vogels die binnenkomen kunnen al rechtstreeks in een surrogaat nest buiten zodat de binnenfase kan worden overgeslagen.

WEES ALTIJD VOORZICHTIG MET HET VERENPAK WANT DIT MOET IN GOEDE CONDITIE ZIJN OM TE OVERLEVEN !!!!!!!!!!!!!

Een gierzwaluw zal nooit zelf eten dus moet altijd gevoed worden.

Elke soort heeft zijn eigen voedsel al zijn er veel soorten die aardig overeenkomen,

Soms is het soort nog moeilijk te bepalen vaak kun je aan de snavel herlijden wat voor een

Voedsel het dier van nature eet.

Er is in de vogelmap hierover ook verdere uitgebreide informatie.





23. Verzorging.

We zorgen dat er ten alle tijden een gevarieerd aanbod is van voedsel en medicijnen.

Er zullen altijd lege en schone verblijven zijn zodat de dieren een geschikte plek krijgen.

Alle dieren worden dagelijks gecheckt , veranderingen en bijzonderheden worden genoteerd.

Dieren zijn in verschillende stadia van zorg en behoefte dus elke keer wordt bekeken of de

Omstandigheden zodanig verandert zijn dat de situatie verandering eist qua voedsel, huisvesting,

Medicijnen enz.

Er zijn natuurlijk voor alle diersoorten en leeftijden verschillende behoeftes waar rekening

Mee gehouden wordt zo dat ze op de beste en een natuurgetrouwe manier kunnen op groeien

Revalideren enz.

Voor een aantal diersoorten zal er nog wat speciale info worden toe gevoegd.

Verder is een aantal standaard dingen gewoon belangrijk voor elk (jong) dier !

Voor de hele kleine zoogdieren is het soms nodig ze biest te geven , er zijn instant soorten of anders proberen we een zo passend mogelijke biest te gebruiken.

De soorten die niet apart gemeld worden zoals verschillende kleine zoogdiersoorten, herten enz. worden vaak met een soort gelijke melk grootgebracht alleen in andere hoeveelheden en met wat andere extra's dat is soms ook wat improviseren.

Wij zullen altijd bij enige twijfel contact op nemen met andere opvangcentra's of een deskundige dierenarts.



Dieren die al behandeld zijn of met een behandelplan van de dierenarts komen ,dan volgen we dit plan of ze moeten de plank helemaal mis slaan wat helaas ook nog wel eens gebeurt.

Sommige soorten vogels zijn soms als de omstandigheden er naar zijn te plaatsen in een nest met soortgenoten in de natuur, we hebben in onze omgeving een diversiteit van nesten en hebben ook meerdere nestkastjes opgehangen.

Jonge dieren worden mits zij verder gezond zijn zoveel mogelijk in groepen geplaatst.

Vaak zullen zij nog warmte nodig hebben, al naar gelang behoefte in couveuse,

onder een warmte lamp of op een warmtemat.

Een is er geen dus zo nodig plaatsen we een spiegeltje bij het jonge dier.

Elke diersoort heeft specifieke voeding nodig , en vooral van de jonge dieren zullen de meeste

soorten gevoed of gestopt moeten worden.

Als overgang kan de eerste 24 uur zo nodig een elektrolyten oplossing gegeven worden.


Belangrijk is dat de voedingsschema's gehandhaafd worden naar gelang behoefte.

Dit kan per dier verschillend zijn, dat leert de ervaring.

Belangrijk is dat de verblijven goed schoongehouden worden maar dit moet zeer zeker niet ten koste gaan van de rust die het dier nodig heeft !

Het aanbieden van het voedsel gebeurt op een zo natuurlijk mogelijke manier gecombineerd met een zo hygiënisch mogelijke manier.

We geven de dieren de kans zich op een zo natuurlijk mogelijke manier te gedragen dat kan betekenen dat sommigen bijv. de kans moeten hebben weg te kruipen of bijv. donker gehuisvest moeten worden.



Overgangen in voedsel of in verschillende stadia van huisvesting moeten altijd met de nodige zorg, voorzichtigheid en rust worden gedaan zodat dit de vooruit gang niet belemmerd.

Voorbeelden hiervan zijn ;

Het vloeibare voedsel eerst met het vaste te vermengen , en dus niet in een keer over te gaan op vast voedsel .

Een dier dat uit de couveuse komt kan niet in een keer naar buiten dus zal de temperatuur eerst afgebouwd moeten worden, en het verblijf zo nodig aan de behoefte aangepast zijn.

VERGEET DUS NOOIT DAT DIEREN OP WELKE MANIER DAN OOK ZEER GEVOELIG ZIJN VOOR VERANDERING !!!!!!!!!!!

Verder is het heel belangrijk niet te vergeten dat veel jonge zoogdieren de eerste tijd “geholpen” moeten worden met het poepen en plassen dus vergeet niet dat te stimuleren zolang dat nodig is. Wat er in gaat moet er immers ook weer uit !

Belangrijk

We adviseren bij alle jonge dieren eerst alleen elektrolyten te geven ook reekalveren (maar dan niet de soort voor kleine dieren maar voor kalveren) omdat zeker als ze naar een andere opvang moeten elk verschil in samenstelling van melk een groot risico met zich mee brengt.

Houdt anders eerst even contact met de collega asielhouder om te overleggen zodat het dier zo min mogelijk van voeding enz. hoeft te verwisselen.

Als ze pasgeboren zijn is instant-biest nodig, als het te lang duurt voordat ze op het juiste adres zijn.

CAMERASYSTEEM :

Dit is de perfecte oplossing voor wilde schuwe en stressgevoelige dieren.


Je kunt zo het dier volgen zonder dat je er steeds bij hoeft te komen.

Dat wil zeggen dat je vaak veel beter kunt beoordelen hoe het met het dier gesteld is ,

Omdat het niet de stress van benadering heeft en zich vrijer kan gedragen.

We hopen dit systeem in de toekomst nog verder uit te breiden aangezien het aantal dieren dat hier mee gebaat is elk jaar toeneemt !

Binnen, buiten, dichtbij of verder weg dit is echt aan te bevelen.



EEKHOORNS :

Huisvesting:

Kleine eekhoorns tot ongeveer 5 weken hebben warmte nodig, een couveuse of een plastik bak met draaddeksel en daar boven een warmte lamp. Bedek de bodem met een handdoek.

Met een week of 5 gaan de ogen open en kunnen ze in een kooi die niet te hoog mag zijn (ongeveer 50 cm) van wegen het vallen.

Op de bodem berkensnippers en natuurlijk een handdoek om in weg te kruipen.

Met een week of 8 mag de kooi iets hoger zijn en na 10 weken is grote en hoogte als het goed gaat geen probleem meer.

Met een week of 12 als het weer goed is kunnen ze naar buiten.
 Hier moeten ze goed kunnen klimmen en meerdere nestkasten hebben.
 Verder veel natuurlijk voedsel aanbieden en het dier zich goed voorlaten bereiden op zijn of haar vrijlating.
 Biedt ook voldoende beschutting met dennentakken en zorg dat er een sluis aan het verblijf zit.

Voeding ;

Eerste 24 uur elektrolyten ,daarna speciale melk.(1 deel multimilk met 2 delen esbilac en 4,5 delen afg. water).

Gebruik kleine spuitjes zodat het dier zich niet verslikt (liefst eerst 1 ml) met een spec. speentje.

Houd het diertje goed schoon en stimuleer het bij elke voeding.

Vanaf een week of 5 (dan zijn de oogjes ook open) knabbels aanbieden zoals knaagdieren\hamstervoer met wat extra zonnepitten, maïs en pinda's.

En af en toe een stukje fruit of wortel en wat gedroogd brood.

Verder zijn ze gek op noten en van alles uit de natuur ,eerst zul je deze moeten kraken later kunnen ze dat zonder problemen zelf en is een maïskolf of walnoot ook mooi tijdverdrijf.

Met de overgang van het voedsel kun je ook bambix geven(met de speciale melk) en olvarit fruit . Dit werkt ook bij zwakke of zieke eekhoorns.

Weeg geregeld en denk er goed omdat dat deze jongens behoorlijk kunnen bijten.

Probeer ook deze dieren als het kan samen te huisvesten zodat ze sociaal op groeien.

Vanaf een maand of 4 moet je zorgen dat ze zelfstandig zijn .Het verblijf in de buitenren voor jonge dieren voordat ze vrij gaan is minstens 2-3 weken.

Volw. Dieren graag terug op of nabij de vindplaats en jonge dieren in een voor hun geschikt gebied liefst met enige nazorg wat voeding betreft, zorg dat je ze uitzet als het een paar dagen bestendig(droog) weer is.

Late jongen zullen ineen buitenren overwinteren moeten omdat zij geen voedselvoorraad meer aan kunnen leggen.

Eekhoornapotheek :

Iverquantel- om te ontwormen
 Carprofen- als pijnstilling

Toltrazuril- tegen coccidiose
 Sulfatrim - antibiotica

Stronghold– tegen parasieten

Fucithalmic– antibiotica oogzalf

Arnica en rescue remedie van bach

Verder zijn ze gek op takken van bijv. wilg en beuk,berk.



Grootbrengen van babyegeltjes:

Egelmoedermelk is extreem geconcentreerd en zeer energie en vet rijk.

Esbilac komt redelijk in de buurt en ik doe er zo nodig wat multimilk bij en begin zo snel mogelijk ook met vast voedsel (roerei – tartaar – kitten blikvoer –dode meelwormen enz.)

Zo krijgen ze ook voldoende eiwitten binnen.

Omdat de vervangende melk anders is moet je meer geven, namelijk ongeveer 25 % van het lichaamsgewicht (de moedermelk is 15 % voldoende).

Gewicht wordt door meerdere factoren bepaald waaronder de grote van de worp.

Soms kan het nodig zijn af en toe vit. b toe te voegen of de melk aanmaken met venkelthee is ook een mogelijkheid.

Plas en poep moeten gestimuleerd worden bij elke voeding, meestal tot zij compleet zelfstandig eten.

Mocht de huid wat droog zijn voorzichtig met een paar druppels babyolie inmasseren.

Gewichtstoename:

Het beste is het dat de eerste 18 dagen het dier 4-6gram per dag aankomt. Vanaf ongeveer 90 gram(19 dagen) mag dit 9-11 gram per dag zijn.

Dan kunnen ze ook langzaam een gedeelte van de melk van een plat schaaltje drinken , wel bijvoeden.

Met een dag of 25 zouden ze zelfstandig alles op moeten kunnen slobberen en wordt langzaam ook vast voedsel aangeboden.

TOT DE LEEFTIJD VAN ONGEVEER 2 WEKEN OOK S'NACHTS FLESSEN !!!

Bij mooi weer kunnen egels vanaf 250 gram naar buiten in een verblijf, al naar gelang het wat frisser is moeten ze zwaarder zijn tot ongeveer 400 gram.

Zorg voor aanbod van natuurlijk voedsel zodat ze gedurende 14 dagen hun natuurlijk gedrag nog meer kunnen "oefenen".

Dan kunnen ze vrij, kleintjes nog bijvoeren, en als het al laat in het seizoen is in een buitenverblijf overwinteren.

Er kan niets op tegen terug in de natuur maar soms is het al winter en zullen er een aantal in de opvang binnen overwinteren moeten.

Enkele tips bij klachten !

Kramp,opgeblazen buikje: kummelthee,of een homeopathisch (alc. vrij) middel

Verstopping : paar druppeltjes plantaardige olie

Diarree : vaak door overgang voedsel , alleen als nodig wat antibiotica

Verlamingsverschijnselen : vitamine B complex

Kleintjes alleen ontwormen als er ook daadwerkelijk wormen aanwezig zijn, dus niet standaard behandelen.



JONGE KONIJNEN EN HAZEN :

Allereerst is het belangrijk te weten om welk van de 2 soorten het gaat. Konijnen worden onder de grond, kaal en blind geboren terwijl een haasje al een compleet pakketje is bij de geboorte aangezien die ook moet overleven zonder beschutting boven de grond.

Als melkpoeder komen in aanmerking 3 delen multimilk en i deel KMR op 5 delen water of bijvoorbeeld milkodog.

Werk altijd (bij alle dieren) met afgekookt water dat iets meer dan lauw is.

Jonge hazen krijgen van begin af aan hooi en konijnen vanaf een dag of 10. Zorg altijd voor vers water en voedsel en begin met wat droog brood of een biscuittje en geef maar langzaam elke keer iets meer groenvoer en natuurlijk knabbelmix.

Gebruik zoveel mogelijk aanbod van groen uit de natuur.

Geef bij diarree (en de eerste 24 uur) elektrolyten. En wat peterselie

Bij longontsteking bijv. baytril

Wormen bijv. flubenol pasta, 0,1 ml per 200 gram. Na 3 weken herhalen.
Appertex bij coccidiose 1 tablet per kg oplossen in water en toedienen.
Baytril bij snot, 2,5 % 2,5 mg per kilo 5 dagen lang

Geef zo min mogelijk medicijnen ,dus alleen als echt nodig vooral bij het kleine spul.

Hazen worden door moeder 3 tot 4 weken gezoogd maar in de opvang is het vaak raadzaam dit zo nodig wat langer te doen.

Voor konijnen geldt ongeveer het zelfde dus zeker 4 weken in de opvang flessen liefst als het nodig is iets langer.

Bouw de voeding af en zorg dat het dier voldoende eet voor dat je het naar een buiten verblijf doet waar de dieren zich zeker een of twee weken op hun vrijlating kunnen voorbereiden.

Dus in een ruimte zo groot dat zij hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen en alles zo danig kunnen ontwikkelen dat ze daarna in de natuur een niet te grote overgang krijgen.

Mocht het echter al winter worden dan zullen de dieren in een ruim buitenverblijf moeten overwinteren, dit gebeurt soms met late jongen. Zorg voor voldoende dekkingsmogelijkheden en een tocht en vochtvrij nachthok.

Een gedeelte van de ren moet winddicht en overkapt zijn.

Zorg dat het vervoer bij het vrijlaten zo kort mogelijk duurt en zo rustig mogelijk gebeurt.

In een bak met handdoek erover of bijvoorbeeld in een jute zak.

Een haas zal soms meteen de benen nemen maar een konijn moet rustig zelf te voorschijn kunnen komen. Mannetjes hazen zijn ook in de natuur anders met hun gedrag vrouwtjes zijn veel afwachtender of drukken zich eerst.

Kleine marterachtigen :

Als de kleintjes binnenkomen kijken we ze eerst even goed na, vaak zijn ze onderkoeld, uitgedroogd en passief dus is snel en goed handelen geboden.

Het kleine spul onder ongeveer 5 weken heeft net als andere dieren warmte nodig (en dat geldt natuurlijk ook voor verzwakte Volw. Dieren), al naar gelang behoefte dus onder de lamp of in de couveuse.

Ook hier geldt stimuleren, vaak een behoorlijk lange periode want de oogjes gaan pas omstreeks de 5^e week open.

Bied al meerdere keren ook voordat de oogjes open gaan vast voedsel aan zoals bijv. Kitten blikvoer van whiskas.

Ga als mogelijk ook geleidelijk stukjes natuurlijk voedsel geven.

Als flesvoeding is o.a. KMR geschikt maar hier hebben we goede ervaringen met multimilk met esbilac.

Weeg het diertje zo nodig om dat het de eerste tijd nog al een geknoei is met het zelf eten en er wel bijgevoerd moet worden.

Met zo'n week of 6 kan er soms al gestopt worden met flesvoeding, al naar gelang het patiëntje want dat is ook nog al eens verschillend .

Beter wat langer dan te kort.

Brokjes mogen dan ook gegeven worden in een bakje zo dat ze kunnen eten wanneer ze dat willen, en vers water !

Zorg voor goede kwaliteit brokjes (voeding) van deze periode moeten ze het hun hele leven nog hebben.

Uitdroging : paar keer per dag 5–20 ml onderhuids spuiten al naar gelang grote.

Blaasontsteking en longontsteking : antibiotica zoals bijv. baytril

Hitte beslag als het dier juist te warm en slap is :langzaam afkoelen met natte lappen.

Gasvorming : het diertje met het achterste deel onderdompelen in warm water.

Shock : warm houden, evt. als kan wat water met druivensuiker geven,leg het kopje iets lager dan het lichaam.

Als het diertje eenmaal zover is zal het ook moeten leren prooien vangen en verorberen, dit is essentieel voor de kans die hij maakt om het te gaan redden in de natuur , begin hier zo vroeg mogelijk mee en zorg dat het dier schuw en goed voorbereid de natuur weer in gaat.

Anders stuur je het een hongerdood te gemoed.

Een goed buitenverblijf waar het dier al zijn natuurlijke gedragingen kan vertonen is echt van levensbelang.

Vanuit hier het dier liefst in een kist vervoeren, we gebruiken hier kisten met een schuifstelsel waar het dier al aan gewend is zodat je er niet achter aan hoeft te vangen en zo veel onnodige stress voorkomt voor mens en dier.

Verder maken we gebruik van een camera systeem bij wilde stressgevoelige dieren zodat je er zo min mogelijk bij hoeft te komen en ze zo goed in de gaten kunt houden.

Reeën bij Opvang Noach :

Volwassen dieren nemen we alleen in behandeling als zij niet te ernstig gewond zijn dus geen botbreuken enz. want dan is het beter ze uit hun lijden te verlossen. Het liefst terplekke zodat hun de stress van het vervoer en alles er om heen bespaart blijft.

Met kalveren zijn er iets meer mogelijkheden maar de terugkeer in de natuur is een vereiste .

De dieren verblijven hier (Aaltenseweg 21) zolang zij veel zorg nodig hebben en/of geflest moeten worden.

Volwassen exemplaren gaan zo veel mogelijk terug naar de vindplaats (mits mogelijk) en andere dieren worden uitgezet via een uitzetren. Dit om de slagingskansen te vergroten en het natuurlijk gedrag van de dieren (die normaal 11 maanden) bij hun moeder zijn na te bootsen.

In deze uitzetrennen zijn kleine en een hele grote accommodatie voor de overgang veilig te laten verlopen en het eventueel apart kunnen zetten van dieren mocht dit nodig zijn.

Deze rennen staan in een gebied waar reeën al jaren leven zodat de laatste stap naar de vrijheid hier prima bij aansluit en zij ook via de afrastering al contact kunnen leggen met hun soortgenoten.

We hebben een uitzetren in Doetinchem die in ons beheer is, gelegen aan de achterkant van het terrein Hulleweg 9 . Daar gaan we dagelijks ,zo nodig meerdere malen per dag heen en de bewoners van Hulleweg 9 houden een oogje in het zeil en seinen ons in bij calamiteiten.

Aangezien zij ook ervaring hebben met reeën is dit een perfecte oplossing. De tweede ren waar we gebruik van kunnen maken staat in Vriezenveen ,bij dhr. A.Kobes die ook aangesloten is bij St. Reeënopvang Nederland en zeer ervaren is met het verzorgen, revalideren en opvangen van reeën.

Verder werken we zoveel mogelijk samen met andere opvangcentra die ook reeën opvangen of dat niet doen maar wel een adres nodig hebben waar ze met eventueel aangeboden dieren naar toe kunnen. Hier vallen ook een aantal dierenambulances uit verschillende delen van Nederland onder die zich hier met reeën melden.

Een is er geen zeggen we altijd en we streven er naar geen (jonge dieren) langere tijd alleen te huisvesten. Het is in het belang van het dier dat deze met soortgenoten op groeit.

Voor de rest doen we alles ook volgens het protocol, hierin staat vermeld hoe we met de diverse bijkomende zaken omgaan.

Veel tijd steken we in het zo veel en zo goed mogelijk van voorlichting om onnodig dierenleed te voorkomen.

Dit geldt van particulier, tot ambulances of groepen, scholen en verenigingen en men kan ook altijd terecht op onze site of die van St. Reeënopvang Nederland.

Alle dieren, meldingen enz. worden bijgehouden in de algemene administratie maar ook met speciale formulieren waarin alle gegevens genoteerd worden.

Verder kan men in het logboek ook nog bijzonderheden lezen.

Door de jaren heen hebben we al veel ervaring met reeën opgedaan maar we kunnen zo nodig beroep doen op onze dieren arts en ook informatie inwinnen bij de dierenarts van burgers zoo ,die ook veel weet over verschillende hoefdieren(en andere).

REEKALVEREN :

Voeding starten met zo nodig de eerste 24 uur elektrolyten, of zo nodig als het een pasgeboren kalf is met biest.

Er is een kant en klaar biest te koop bij de welkoop eigenlijk geschikt voor geiten, lammeren maar deze voldoet prima.

Wij voeden het kalf de eerste dagen om de 3 uur met 20 tot 30 ml. maximaal per keer.

Dus ook s'nachts, als het ree langzaam aan de voeding went is de kans op bijvoorbeeld diarree een stuk kleiner.

Na een week als het goed gaat de tijd tussen de voedingen iets verruimen maar minimaal 6 maal per dag voeden, is het een erg jong dier is het beter het 3 uur schema zeker 2 tot 3 weken vast te houden.

Onze ervaring is dat het goed vasthouden aan een schema, dus op gezette tijden voeden van groot belang is.

Ook na de eerste 3 of 4 weken nooit meer dan 300-320 ml. per dag verdeeld over de verschillende voedingen.

Het diertje moet de eerste tijd gestimuleerd worden om te poepen en plassen. Dit kan met watten, keukenrol of washandjes(elke keer schone), hygiëne is erg belangrijk.

Zo houd je ook controle op de ontlasting en ben je er met eventuele diarree meteen bij.

Vanaf dag 1 moeten er een aantal keren per dag verse twijggjes van verschillende soorten zoals wilg en berk aangeboden worden. Dat hoeft eerst nog niet in grote hoeveelheden maar ze zijn fijnproevers en willen dat verlepte spul zeker niet eten.

Ook zorg je voor een bakje vers drinkwater en een laag schaaltje zwart (schoon) zand gemend met wat vezels(een schep bambix, een gekruimeld biscuit of cracker) dit is voor de ingewanden .Af e toe even met het bekje er in duwen.

Het dier heeft beweging nodig naarmate het ouder wordt ! En frisse lucht ,zorg wel voor een niet te grote of langdurige overgang zeker niet als het dier eerst erg zwak was en verwarmd heeft gelegen.

Hoe eerder het dier ook vast voedsel eet des te beter , daarom ook niet teveel laten drinken.

De frequentie van de voedingen langzaam afbouwen en rekening houden met de datum van “zelfstandigheid”.

Wij geven Verse volle melk met daar aan toegevoegd op 1 liter 2 eidooiers en een eetlepel druivensuiker alsmede een aantal ad3e druppels. Alles gaat door een theezeef en wordt goed gemengd .en wordt in de koelkast bewaard. Gegeven wordt de voeding uit babyflesjes die elke keer goed gereinigd en geregeld uitgekookt worden. Geven op handwarme temperatuur niet te koud of te warm.

Bij diarree geven we norit en gaan we terug minimaal 24 uur op elektrolyten.

Een klein dier dat ziek is kan zijn temperatuur niet vasthouden en moet zo nodig warm gelegd worden.(warmtelamp of warmtematje).

Zorg dat het dier altijd droog en schoon kan liggen , biedt ook vers (kruiden) hooi aan.

Teken kunnen het dier bloedarmoede bezorgen dus het dier behandelen met bijv. frontline als het sterk genoeg is maar anders met Bijv. stronghold of Advocate en dan doseren naar gewicht.

Medicijnen waar wij goede ervaringen hebben zijn, Baytril 2,5 %.

Homeopathische middelen voor de blaas.

Gebruik vooral niet te snel te veel rommel.

Aangeraden tegen coccidiose is baycox 5 %.

Laat het dier in zijn waarde en ,een is er geen, dus overleg zo nodig met collega asielhouders !

Bij uitdrogingsverschijnselen kun je onderhuids vocht spuiten, pas op met te dwangmatig voeden want het loopt zo in de longen.

Het dier zal veel inbreng van natuurlijk voedsel nodig hebben en bied dit op een zo natuurlijk mogelijke manier aan.

24. Vaak voorkomende problemen.

Korte beschrijving van hoe te handelen bij vaker voorkomende problemen.

Abces : Dit gezwel dat veroorzaakt wordt door een ontsteking voelt vak warm aan en ziet rood. Abscessen zijn gevuld met pus, wondvocht en bloed.

Het moet open gesneden worden (vaak gebeurt dit door de dierenarts) en de viezigheid wordt er uit gedrukt.

De wond wordt goed uit gespoeld en evt. voor het grootste gedeelte gehecht.

Een kleine opening is nodig zodat de eventuele pus er wel uit kan.

Het dier krijgt nog een antibioticakuur.

Afgebonden poot : Vaak ontstaat dit door visdraad, een te nauwe ring enz.

De poot is dik, warm rood, en puilt soms om de knelling uit.

Verwijder het draad (of ander materiaal) dat de afbinding veroorzaakt voorzichtig !

Een eventuele wond ontsmetten en antibiotica geven.

Mocht de poot toch afsterven is het beter te euthanaseren.

Bevroren Poten : Vaak zijn de tenen bleek en dik .

Masseer de poten en tenen voorzichtig met wat olie, niet verwarmen !

Mocht het toch afsterven dan is euthanasie de enige optie.

Ontstekingen in gewrichten : Vaak door bacteriën of een opgelopen knal.

Het gewricht voelt warm en dik aan, is ook vaak pijnlijk en wordt daarom ontzien.

Met een antibioticakuur proberen het probleem op te lossen.

Ontsteking van een oog : Kan komen door een knal, irritatie of bijv. bacteriën

(vaak dan aan 2 ogen) De ogen zien er wat rood, waterig uit.

Meestal is behandelen met oogzalf voldoende, wel goed volhouden.

Wondjes : Kijk goed naar de wond, maak deze schoon nadat je evt. viezigheid verwijderd hebt.

Oppervlakkige wonden kunnen vaak alleen af met acederm spray of zalf.

Soms is hechten nodig, vaak kunnen we dat zelf maar bij grotere, diepere verwondingen laten we het door een dierenarts doen .De wond moet goed in de gaten en zo nodig behandeld worden elke dag samen met een antibiotica kuur.

Vishaken : Verwijder eerst al het draad tot een klein eindje aan de haak. Kijk waar de haak zit en knip het oog eraf met de tang en trek het door in de richting zoals die er ook ingegaan is.

Als het erg diep zit zal de dierenarts het haakje operatief moeten verwijderen.

Wees voorzichtig omdat je het niet erger moet maken dan het al is.

Vaak is wat antibiotica al naar gelang de ernst van de situatie raadzaam.

Botbreuken : “mooie”breuken zijn vaak goed te herstellen vooral als ze recent zijn.

Oude breuken die al helemaal ontstoken of vergroeid zijn zijn niet te herstellen dus dan is euthanasie beter. Breuken in gewrichten lijden vaak tot stijve vleugels ,dit is ook geen optie.

Mocht er een kans op herstel zijn dan wordt de vleugel of poot zodanig gefixeerd dat het goed in de luiste stand blijkt zitten, met een week of 2 (MIN) kan het verband eraf en het dier langzaam gaan revalideren. In de herstel periode heeft het dier een rustige plek nodig om te herstellen ,soms ook een wat klein verblijf.

KATTENSLACHTOFFERS :

Dit komt veel voor, als de verwondingen te erg zijn dan euthanaseren we, maar anders krijgen ze baytrill en eventuele wondverzorging, als de eerste 24 uur halen dan gaat het meestal wel goed. Als de luchtzak geperforeerd is niks doen want dat is vaak wel door het dier zelf te herstellen, in ieder geval niet door gaan prikken of zo !

Ook baytril geven als je op het oog zo snel niks ziet !

Raamslachtoffers :

Deze dieren evt. oog zalven als nodig en verder zo rustig mogelijk weg zetten, water in een laag schaalje , en de eerste 24 uur zeker geen voedsel !

Zorg dat het dier donker zit.

Uitdroging :

Er kan onderhuids vocht worden toegediend en als we oraal wat geven voegen we daar wat druivensuiker aan toe, zodat het dier wat extra op kracht komt !

Stress :

Veel dieren hebben als ze hier komen al heel wat enerverende uren achter de rug, dus hadden ze nog geen stress dan krijgen ze het wel ! Daarom is het soms belangrijk eerst het dier tot rust te laten komen en evt. Rescue te geven. Ook stress kan de reden zijn dat ze het niet halen dus houdt daar rekening mee.

VERKEERDE VOEDING :

Helaas hebben mensen van alles al in de dieren gepropt, te veel of het verkeerde voedsel.

Laat het dier dan eerst tot rust komen en schakel eventueel eerst over op elektrolyten of

Zet het dier op dieet.

Bekijk vooral goed de ontlasting , naar aanleiding daarvan kunnen er misschien nog andere

Alternatieven gevonden worden.

Soms echter si het al zodanig verprutst dat het dier alleen nog een lijdensweg naar het einde

Rest, pas dan a.u.b. euthanasie toe .

25. Verzorging kleine zoogdieren.

Moeten zij vervoerd worden dan dienen zij warm gehouden te worden. Dit kan door een hotpack of een kruik.(een flesje met sok is ook prima)

Bij binnenkomst na evt. nodige behandeling zo snel mogelijk in couveuse(minimaal 30 graden ligt aan de grootte), onder de warmte lamp of op een warmtemat.

Elke diersoort heeft een andere samenstelling van te met afgekookt water dat je iets laat af koelen aangemaakt moet worden.

Er zijn ook altijd verschillende soorten flessemateriaal en voeding aanwezig , indien nodig wordt er de eerste 24 uur een elektrolyten oplossing gegeven. Zeker als het dier al aan de diarree is.

Ze verblijven in bakken met een handdoek en zo nodig hooi of ander materiaal, soms ook al ondiepe schaaltes water.
Dit alles naar behoefte ,diersoort en leeftijd.

De frequentie waarop gevoed moet worden is ook zeer afhankelijk van soort, leeftijd, conditie en behoefte voor mij is dat gewoon een kwestie van gevoel maar ik zal een kleine leidraad bijvoegen en als het nodig is altijd eerst informeren.

De boel wordt elke dag verschoont bij het kleine spul, ook de washandjes en handdoeken die gebruikt worden bij het flessen en stimuleren in de was !

Zo nodig kan bij een eenling een knuffel ingelegd worden voor gezelschap.

Er is of komt een moment waarop ook andere voeding wordt aangeboden , dit wordt ook elke dag vervangen en soms zo nodig vaker.

Gewogen wordt er in het schaalte op een doekje, dat is niet elke dag perse nodig zeker niet na verloop van tijd. Wel wordt het gewicht en evt. bijzonderheden zoveel mogelijk bij gehouden op het kaartje van het desbetreffende dier.

De overgang van vloeibaar op vast voedsel gaat altijd geleidelijk en gebeurt met zorg, soms d.m.v. een soort pap van verschillende bestanddelen.

De dieren worden zodanig gehuisvest dat ze niet uit hun verblijf kunnen klimmen en zichzelf of een ander dier kunnen verwonden.

Ook het warmte niveau wordt rustig afgebouwd en aangepast, alsmede de passende verblijven.

DE dieren komen elke keer dichterbij de vrijheid en kunnen zich daar goed op voorbereiden.



26. Eekhoorns.

Belangrijk te vermelden is dat volwassen dieren nooit samen gehuisvest moeten worden !!!!

Dit is meestal niet raadzaam bij zoogdieren vooral , en zelfs bij wat vogels niet maar ook hier zeker niet!!!!!!!

Eekhoorns zijn te voeden met zaden, noten, fruit maar ook lusten zij graag een eitje ,pinda,s

Verschillende soorten knaagdiervoer enz.

Verder zorgen we altijd voor een voorraadje uit de natuur, wal- hazel- beuke- nootjes, Tamme kastanjes maïskolven en we zorgen voor regelmatig verse knaagtakken.

Denk er om dat ze erg hard kunnen bijten dus wees daar voorzichtig mee !

Ook eekhoorns kunnen mix. hebben.

Deze kleine klimmers hebben ook warmte nodig maar zorg vooral dat ze veilig gehuisvest zijn

in de warmte. Dus pas op met warmtedekens.

Ook in dit geval geldt warmte naar grootte en behoefte en ook volwassen eekhoorns in shock doet warmte heel goed.

Voeden met Multimilk en esbilac 1 : 2 voorzichtig met de kleintjes altijd eerst 1 ml. Spuitje gebruiken.

Ze kruipen graag weg dus warm en zacht met onze speciale fleeezak of washandjes en handdoeken.

In verhouding moeten eekhoorns lang geholpen worden met het plassen en vaak krijg je ook exemplaren binnen die eerst erg nodig van iets afmoeten.

Aan ongedierte geen gebrek dus als de gezondheid het toe laat zo snel mogelijk behandelen de kleintjes met stronghold in gepaste dosering. Maar ze zijn er aardig goed van af te vangen bij de kleintjes.

Pas met een week of 4,5 gaan de oogjes open.

Als ze beginnen te knagen aan het voedsel dat bijtijds aangeboden wordt dan kun je ook in plaats van een voeding al pap er in zetten.

Dit wordt van de zelfde melk met brinta gemaakt.

De overgang van verblijven ook langzaam groter doen zo dat ze goed leren klauteren,

En ze niet meteen meters naar beneden vallen.

Vergis je niet aan de stress gevoeligheid bij oudere dieren, zij hebben dan ook rust nodig en moeten zich goed kunnen verstoppen.