

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA



Heide 19, Roggel



Datum : 22 maart 2017

Rapportnummer : 217-RHe19-nw-v1

**Project : Quick scan flora en fauna aan de
Heide 19 te Roggel**

Opdrachtgever : Bergs Advies

Datum rapport : 22 maart 2017

Van toepassing zijnde certificaat : NEN-EN-ISO 9001, 2008
Van toepassing zijnde protocollen : --
Nummer certificaat : EC-KWA-00044

Projectleider : Dhr. Ir. W.A. van Aerle
Collegiale toets : Mevr. Ing. A. van der Vleuten

Voor akkoord:
W.A. van Aerle



Voor akkoord:
A. van der Vleuten



Inhoudsopgave

<u>Hfdst.</u>	<u>Titel</u>	<u>Blz.</u>
1.	Inleiding	1
2.	Inventarisatie flora en fauna	2
2.1	Algemeen	2
2.2	Beschrijving literatuuronderzoek	3
2.3	Natuurnetwerk Nederland	4
2.4	Veldonderzoek door M&A	4
2.5	Informatie door de KNNV	5
2.6	Resultaten literatuuronderzoek	6
2.7	Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling	7
3.	Conclusie	10

Bijlagen

Bijlage 1	: Situatietekening en luchtfoto
Bijlage 2	: Resultaten inventarisatie Natuurloket
Bijlage 3	: Foto's bebouwing en omgeving
Bijlage 4	: Natuurbeheerplan Limburg
Bijlage 5	: Natuurgegevens databank provincie Limburg

1. Inleiding

Op 13 januari 2017 is door Berghs Advies aan M&A Omgeving BV opdracht verleend tot het uitvoeren van een quick scan flora en fauna voor een locatie aan de Heide 19 te Roggel. Door de gemeente Leudal is de eis gesteld dat in verband met de bestemmingsplanwijziging voor de realisatie van een laaddock, verharding en koelunits wordt aangetoond dat er geen negatieve consequenties gelden voor de natuurwaarden in het gebied.

Op de onderzoekslocatie is in de huidige situatie een bedrijf voor het telen van gewassen aanwezig. In verband met de bestemmingswijziging dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd en op een later tijdstip een aanvraag voor een omgevingsvergunning te worden ingediend.

Dit natuurwaardenonderzoek beschrijft of het voornemen van de bestemmingswijziging en realisatie van het laaddock consequenties kunnen hebben voor de in het gebied aanwezige beschermde flora en fauna en met name voor uilen en vleermuizen.

De luchtfoto van de locatie is weergegeven in bijlage 1.

2. Inventarisatie flora en fauna

2.1 Algemeen

In dit onderzoek zijn de huidige natuurwaarden onderzocht middels actuele literatuurgegevens. Hiervoor kan op een drietal manieren informatie worden verkregen:

1. Literatuuronderzoek door gegevens op te vragen bij het Natuurhistorisch Genootschappen, de provincie, SOVON, Vlinderstichting, RAVON, FLORON, VZZ en EIS.
2. Literatuuronderzoek middels het nemen van contact met plaatselijke natuur- en milieu instanties als IVN-afdelingen, vogelwachten, kringen van het Natuurhistorisch Genootschap etc.
3. Aanvullende hierop, het uitvoeren van een veldonderzoek.

In onderhavige situatie zijn in eerste instantie stappen 1 en 3 uitgevoerd. Het opnemen met plaatselijke natuurverenigingen was ons inziens in dit geval niet noodzakelijk, daar de inventarisatie voldoende duidelijke gegevens opleverde.

Algemeen doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de aanwezige flora en fauna. Daarbij is de nadruk gelegd op beschermde, bedreigde en schaarse soorten en soorten die specifieke milieumomstandigheden indiceren.

2.2 Literatuuronderzoek

Bij het literatuuronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd;

1. Het Natuurloket (SOVON, De Vlinderstichting, RAVON, EIS Nederland, FLORON, VZZ, BLWG, NMV)
2. Ministerie EZ; Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
3. Natuurnetwerk Nederland (uitwerkingsplan Provincie Noord-Brabant)
4. Wet natuurbescherming (van kracht per 1-1-2017)

Vervolgens is gekeken naar de status van de waarnemingen binnen de Wet natuurbescherming (Wnb), Commissie van Bern en de Nederlandse Rode Lijst. Voor deze en een aantal extra soorten geldt het “Nee, tenzij” principe als deze soorten in het plangebied voorkomen en bij ingrepen die het leefgebied aantasten.

Indien beschermde vogel- en/of zoogdiersoorten voorkomen, gelden binnen de Wet natuurbescherming bij de aanleg van een nieuwe functie in een gebied de voorwaarden van hoofdstuk 3. Hierin wordt voor soorten volgens de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn het verbod om dieren te doden en verwonden, te verontrusten en de nesten, hollen of andere voortplantings- of vaste verblijfplaatsen van deze dieren te verstoren, te beschadigen of weg te nemen.

Dit betekent voor permanente nest- en/of verblijfplaatsen van beschermde soorten dat altijd een ontheffing van de Wnb aangevraagd dient te worden bij Gedeputeerde Staten. Binnen het broedseizoen wordt geen ontheffing verleend voor de verstoring hiervan.

Voor beschermde soorten die alleen in het broedseizoen op de locatie nestelen en/of verblijven, betekent dit dat geen bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in deze periode. Over het algemeen betreft deze periode het voorjaar en begin van de zomer, globaal van 15 maart tot 15 juli. Indien binnen deze periode bouw- en / of sloopwerkzaamheden worden verricht, dan moet een ontheffing in het kader van de Wnb bij Gedeputeerde Staten.

2.3 Natuurnetwerk Nederland / natuurbeheerplan Limburg

Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur) is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Planten en dieren kunnen zich zo van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan.

De provincie Limburg heeft een Natuurbeheerplan Limburg opgesteld dat vergelijkbaar is met het Natuurnetwerk Nederland. In de omgeving van het perceel zijn geen ecologische verbindingszones of te beschermen natuur opgenomen. De onderzoekslocatie zelf is eveneens niet in een waardevol gebied gesitueerd. Ook zijn de gronden niet aangewezen als gewenste nieuwe natuur of te verwerven percelen in het kader van natuurbeheer.

2.4 Veldonderzoek door M&A

Op 18 maart 2017 zijn veldonderzoeken uitgevoerd op de onderzoekslocatie, door W.A. van Aerle. De heer van Aerle heeft deskundigheid op het gebied van flora en fauna en in het bijzonder in inheemse zoogdieren en broedvogels. De buitentemperatuur bedroeg ongeveer 15 °C, luchtvochtigheid 60% en 5/8 bewolgingsgraad. Tijdens het veldbezoek is gekeken naar flora en fauna. Daarbij is rondom het terrein (tot afstand van 200 m) rastermatig het gebied verkend. De afstand van 200 meter is hierbij gekozen op grond van onze ervaringen met de bestemming (agrarisch), indeling van het terrein en het feit dat de aanleg van de wasvijver op het perceel qua milieuhinder (geluid, geur, luchtkwaliteit, licht etc.) reeds op een afstand van 100 meter een relatief kleine bijdrage zal hebben. Eventuele natuurwaarden op grotere afstand zullen geen enkele invloed meer ondervinden van de realisatie van het laaddock, verharding en koelunits.

Tijdens het veldonderzoek zijn op het perceel geen waarnemingen gedaan van schaarse, beschermde en bedreigde soorten noch van beschermde vegetatie. Wel zijn een aantal inheemse soorten (Koolmees, Vink, Buizerd, Roodborst en Spreeuw) waargenomen. Er zijn voor deze soorten voldoende nestmogelijkheden in de omgeving en op het perceel voorhanden.

Bij de inventarisatie is ook speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten, zoals uitwerpselen en achtergelaten nestmateriaal. De omgeving rond het perceel bestaat voornamelijk uit agrarische percelen en wei- en akkerlanden. Ten noorden is een bosgebied gesitueerd.

Tijdens het veldbezoek is de bebouwing op het perceel onderzocht op mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen en uilen. Er zijn geen verblijfplaatsen of -mogelijkheden aangetroffen in de bebouwing op het perceel of in bomen in de directe omgeving.

Bij het veldbezoek is gebruik gemaakt van een vleermuisdetector van het type Heterodyne (model 440 LS). Met de detector zijn geen waarnemingen van vleermuissoorten gedaan.

Andere hulpmiddelen, zoals een mistnetonderzoek of boomcamera zijn niet toegepast omdat met onderhavig onderzoek reeds voldoende informatie is verkregen.

2.5 Informatie door het KNNV

Bij het KNNV te Zeist, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, een vereniging voor veldbiologie, is navraag gedaan over informatie met betrekking tot natuurdata over de locatie Heide 19 te Roggel.

Uit dit telefonisch contact is duidelijk geworden dat de vereniging van de omgeving geen nadere natuurinformatie heeft.

2.6 Resultaten literatuuronderzoek

2.6.1 Natuurloket

Binnen de kilometerhokken 191.000 (X) en 366.000-367.000 (Y) zijn volgens het Natuurloket een aantal beschermde flora en fauna geïnventariseerd.

Het blijkt dat 2 vleermuissoorten, 9 landzoogdiersoorten, 39 broedvogelsoorten, 13 wintervogelsoorten, 1 amfibie, 5 vissen, 14 dagvlinders, 14 macronachtvlinders, 1 micronachtvlinder, 8 libelsoorten, 4 sprinkhanen/krekels en 6 overige soortgroepen (o.a. ongewervelden) in de kilometerhokken van de onderzoekslocatie zijn gespot. De inventarisatie van de broedvogels wordt als goed beschouwd en voor de overige soorten als redelijk tot slecht.

Verder zijn 20 vaatplantensoorten, 5 mossoorten en 13 paddestoelen aangetroffen. De inventarisatie kan als onbepaald tot slecht beschouwd worden. In bijlage 2 zijn de volledige gegevens opgenomen.

Op de onderzoekslocatie aan de Heide 19 is het mogelijk dat er vleermuizen, broed- en wintervogelsoorten de locatie gebruiken als foerageergebied. Verblijven of broeden is moeilijk, omdat op de locatie met regelmaat het land wordt bewerkt. Hierbij zouden nesten worden vernietigd.

Voor de overige soorten en soortgroepen leent de locatie zich niet als een juiste habitat, zodat de kans zeer klein is dat deze op de onderzoekslocatie aanwezig zullen zijn.

Aangezien het onderzoeksgebied slechts een klein gedeelte van de kilometerhokken beslaat is het niet zeker dat de geregistreerde soorten ook daadwerkelijk voorkomen binnen het onderzoeksgebied. In paragraaf 2.7 zal daarom voor de verschillende natuursoorten worden aangegeven, hoe waarschijnlijk het zal zijn dat deze voorkomen in het onderzoeksgebied en in hoeverre de ontwikkeling op het perceel van invloed is op de betreffende soorten.

2.6.2 Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

Via het ministerie van EZ zijn de Vogel- en Habitatrichtlijnkaarten beschouwd en hieruit kan worden geconcludeerd dat de locatie op 4 km van het Habitatrichtlijngebied 'Leudal' is gesitueerd en op meer dan 7 km van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied 'De Groote Peel'. Deze afstanden zijn voldoende groot om te kunnen stellen dat de ontwikkelingen geen invloed hebben op deze Natura 2000 gebieden.

2.6.3. Natuurgegevens provincie Limburg

Via de on line-databank van de provincie Limburg, zijn de gegevens met betrekking tot broedvogelsoorten en beschermde vegetatie opgevraagd. In bijlage 5 zijn de volledige resultaten opgenomen.

Op het perceel zijn geen waarnemingen bekend, maar in de directe nabijheid van het perceel zijn de Ekster, Grote Lijster Zomertortel en Boomklever (2012) gesignaleerd bij een inventarisatie. Deze soorten zullen geen nadelige effecten ondervinden van de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing op het perceel.

2.7. Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling

De fysieke ontwikkeling ter plaatse betreft de aanleg van een laaddock, verharding en koelunits.

Het aantal verkeersontwikkelingen zal door de plannen niet wijzigen. De emissie van geluid, geur of stof zal door de nieuwe ontwikkeling ruimschoots binnen de te stellen normering blijven.

Per natuursoort zal worden aangegeven wat de invloed van de ontwikkeling is op de mogelijk voorkomende natuursoorten zal zijn.

Flora

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten planten aangetroffen. Er is dus geen invloed van de ontwikkeling hierop. Het perceel is grotendeels bebouwd of verhard, zodat waardevolle flora niet de kans krijgt om te groeien.

Vogels

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied geschikt is als onderdeel van het foerageergebied. Er zijn een aantal inheemse soorten waargenomen, maar geen nesten of mogelijke verblijfplaatsen. Door de ontwikkeling op het perceel wordt het mogelijke foerageergebied gewijzigd, maar in de omgeving blijven ruimschoots voldoende mogelijkheden over, zodat de invloed op de vogels te verwaarlozen is.

Zoogdieren

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat de omgeving van het onderzoeksgebied geschikt is voor een aantal grondgebonden zoogdieren (o.a. Konijn en Mol). Tijdens het veldbezoek zijn echter geen sporen aangetroffen van beschermde zoogdieren. Ook voor de Das is het aangrenzende gebied geschikt als foerageergebied. Tijdens het veldbezoek zijn echter geen sporen aangetroffen van de Das.

In de bomen rondom het perceel zijn geen sporen of mogelijke verblijfplaatsen aangetroffen van vleermuizen. Het is wel mogelijk dat het gebied wordt gebruikt als foerageergebied.

De ontwikkeling op het perceel brengt weliswaar een wijziging aan het foerageergebied, maar ook hiervoor geldt dat er voldoende foerageermogelijkheden in de directe omgeving resteren, zodat de invloed van de ontwikkeling op genoemde soorten als verwaarloosbaar beschouwd kan worden.

Reptielen en amfibieën

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat de omgeving van het onderzoeksgebied niet geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel reptielen als amfibieën. De voorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van water in de onmiddellijke nabijheid en dat is hier niet het geval.

Vlinders en libellen

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat de omgeving van het onderzoeksgebied minder geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel vlinders als libellen. Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten geconstateerd. De locatie heeft geen begroeiing, zodat betreffende soorten hier geen geschikt leef- of foerageergebied hebben.

Mieren en kevers of overige ongewervelden

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied niet geschikt is voor beschermde soorten kevers, omdat er geen geschikte biotopen aanwezig zijn. Voor het voorkomen van beschermde soorten mieren is de aanwezigheid van open naaldbossen een voorwaarde.

Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten geconstateerd. Ook hier geldt dat de ontwikkeling op het perceel geen invloed heeft op de aanwezigheid van mieren, kevers of overige ongewervelden in het gebied.

Vissen

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat in de omgeving van het onderzoeksgebied geen vissen kunnen voorkomen, omdat er geen water in de directe nabijheid aanwezig is.

3. Conclusie

Door het literatuuronderzoek van de inventarisatie is aangetoond dat het mogelijk is dat in het gebied beschermde flora of fauna (voornamelijk vleermuizen, broed- en wintervogels) voor kunnen komen (zie inventarisatie Natuurloket).

In de nabijheid van het perceel zijn tijdens de veldbezoeken in maart 2017 echter geen waarnemingen gedaan van schaarse soorten. Ook rondom het perceel zijn bij de inventarisaties geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten (waaronder uilen en vleermuizen).

De veldonderzoeken, uitgevoerd in de dag- en avondperiode op 18 maart 2016, zijn binnen het broedvogelseizoen uitgevoerd. Toch is er speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten (ook struweel- en weidevogelsoorten). Onder andere uitwerpselen van broedvogelsoorten en hun kuikens, achtergebleven nestmaterialen en vraatsporen zijn kenmerken waarop speciaal is gelet. Het veldonderzoek kan daarom als vrij uitvoerig worden beschouwd.

Bij de inventarisatie is ook aandacht besteed aan verblijfplaatsen van vleermuizen en nestkasten en -mogelijkheden voor uilen in het gebied. Vooral in de bomen in de omgeving van het perceel is degelijk onderzoek uitgevoerd op o.a. toegangsmogelijkheden en verblijfplaatsen van vleermuizen. Bij de inventarisatie van de vleermuizen is extra aandacht besteed aan mestsporen, keutels en vraatsporen.

Volgens het Natuurnetwerk Nederland zijn er geen ecologische verbindingsszones in de nabijheid van het perceel gesitueerd. Ook is het perceel niet gesitueerd in een waardevol gebied qua natuurwaarden.

Door de realisatie van het laaddock, verharding en koelunits op de locatie, wordt het karakter van het landschap nauwelijks beïnvloed. Er verdwijnen geen verblijfs- of broedmogelijkheden. De eventuele foerageermogelijkheden voor natuursoorten blijven in de directe omgeving nog voldoende voorhanden. Uit oogpunt van de natuurwaarden zal door de nieuwe groenontwikkeling (inpassing en compensatie door beplanting) van de nieuwe bestemming zelfs een positief effect worden bewerkstelligd.

Bij de realisatie van het laaddock dient evenwel aandacht te worden besteed aan eventuele verstoring van natuurwaarden in het algemeen. Door extra zorg hieraan te besteden tijdens de aanlegwerkzaamheden, wordt vermeden dat de dieren hiervan teveel hinder zullen ondervinden.

Op grond van deze inventarisatie gelden er geen belemmeringen voor de plannen op grond van de natuurwaarden.

Bijlage 1 : Situatietekening en luchtfoto



Google Earth

voet
meter



S1. Compensatie, struikensingel 45,00 x 6,00 m



H1.

Inpassing n.a.v. loods

Plangebied: laaddock,
verharding en koelunits

Inpassing n.a.v. laaddock

Bijlage 2 : Resultaten inventarisatie Natuurloket

Beknopte levering uit de NDFF

Disclaimer

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren. Nieuwe gegevens worden dagelijks toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Projectnaam Heide 19, Roggel
Doel Inventarisatie natuurwaarden
Datum 22-03-2017 08:33
Ordernummer HNL-2017-87
Geselecteerde kilometerhokken
191-366, 191-367



Vragen? Neem contact op met het Serviceteam van de NDFF:

Telefoon: 0800 2356333

E-mail: serviceteamNDFF@natuurloket.nl

191 - 366	vaatplanten	mossen	korstmossen	paddenstoelen	vleermuizen	landzoogdieren	broedvogels	wintervogels	amfibieën	reptielen	vissen	dagvlinders	macronachtvlinders	micronachtvlinders	libellen	sprinkhanen en krekels	overige soortgroepen
Rode-Lijstsoorten						1	5										
Vogelrichtlijn							33	11									
Habitatrichtlijn						1											
WNB-andere soorten (PROV)						1											
WNB-andere soorten (NL)						5			1								
Aantal soorten	19			7		7	33	11	1		5	8	3		8	4	
Detailtering 0-0.25/0.251-1	100%/0%			0%/0%		38%/40%	94%/0%	92%/0%	100%/0%		33%/66%	63%/0%	33%/0%		60%/0%	100%/0%	
Volledigheid onderzoek	slecht	niet	niet	onbepaald	niet	slecht	goed	slecht	slecht	niet	redelijk	redelijk	slecht	niet	redelijk	onbepaald	niet
Onderzoeks-periode	1997-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017

191 - 367	vaatplanten	mossen	korstmossen	paddenstoelen	vleermuizen	landzoogdieren	broedvogels	wintervogels	amfibieën	reptielen	vissen	dagvlinders	macronachtvlinders	micronachtvlinders	libellen	sprinkhanen en krekels	overige soortgroepen
Rode-Lijstsoorten				3	1	1	5					2					
Vogelrichtlijn							40	13									
Habitatrichtlijn					2	1											
WNB-andere soorten (PROV)						3											
WNB-andere soorten (NL)						7											
Aantal soorten	20	5		13	2	9	39	13				14	14	1	8	4	6
Detailtering 0-0.25/0.251-1	78%/0%	100%/0%		42%/0%	0%/0%	35%/21%	94%/0%	31%/0%				44%/3%	66%/0%	100%/0%	40%/10%	100%/0%	17%/17%
Volledigheid onderzoek	slecht	slecht	niet	onbepaald	slecht	slecht	goed	slecht	niet	niet	niet	goed	slecht	slecht	goed	onbepaald	onbepaald
Onderzoeks-periode	1997-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017	2007-2017

Toelichting op de tabel

Soortgroepen

In de gehanteerde indeling is Overige soortgroepen een diverse groep met daarin alle wespen, bijen, mieren, netvleugelige, steenvliegen, kevers, vliegen, muggen, haften, wantsen, cicaden, luizen, schorpioenvliegen en overige insecten, spinnen, mijten, hooiwagens, duizendpoten, miljoenpoten, pissebedden, kakkerlakken, oorwormen, weinigpotigen, vlokreeften, lagere kreeftachtigen, weekdieren, slakken, ringwormen, snoerwormen en wormachtigen zoals bloedzuigers. Ook zeeorganismen als hydroidpoliepen, mosdiertjes, mysisgarnalen, ribkwallen, stekelhuidigen, zakpijpen, zeepissebedden, zeepokken, eendenmossels, krabbezakjes, zeespinnen en grote kreeftachtigen (kreeften, krabben en garnalen) en zeezoogdieren vallen in deze verzamelgroep.

Rode-Lijstsoorten

In de tabel staat voor elk kilometerhok per soortgroep vermeld hoeveel soorten op de Rode Lijst staan. Rode Lijsten worden formeel vastgesteld door de Rijksoverheid. De gehanteerde Rode Lijsten zijn (inclusief link naar website van ministerie van de Rijksoverheid met verwijzing naar pdf van het besluit):

vaatplanten	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
mossen	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
korstmossen	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
paddenstoelen	Besluit Rode Lijsten 4 september 2009
zoogdieren	Besluit Rode Lijsten 4 september 2009
broedvogels	Besluit Rode Lijsten 5 november 2004
amfibieën	Besluit Rode Lijsten 4 september 2009
reptielen	Besluit Rode Lijsten 4 september 2009
vissen	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
dagvlinders	Besluit Rode Lijsten 4 september 2009
macronachtvlinders	geen Rode Lijst
micronachtvlinders	geen Rode Lijst
libellen	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
sprinkhanen en krekels	Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015
overige soortgroepen	Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 (1)

Wet Natuurbescherming – soorten van de Vogelrichtlijn

Alle soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming [paragraaf 3.1](#)

Wet Natuurbescherming – soorten van de Habitatrichtlijn

Alle soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming [paragraaf 3.2](#)

Wet Natuurbescherming – andere beschermde soorten

Alle provinciale soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming [paragraaf 3.3](#)

Deze soortenlijst is limitatief benoemd in een [Bijlage](#) op de wet maar kan op provinciaal niveau worden bijgesteld. Wanneer een hok in meerdere provincies valt wordt de hoogste beschermingscategorie per aangetroffen soort aangehouden.

Wet Natuurbescherming – andere beschermde soorten (landelijke lijst)

Alle landelijk benoemde soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming [paragraaf 3.3](#)

Deze soortenlijst is limitatief benoemd in een [Bijlage](#) op de wet.

Aantal soorten

Het totaal aantal soorten per soortgroep per kilometerhok in de periode zoals aangegeven. Meegenomen zijn alle waarnemingen:

- die geheel of gedeeltelijk binnen de selectie liggen;
- die zijn gevalideerd en daarbij de classificatie 'betrouwbaar' hebben meegekregen;
- waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden.

Indien er een asterisk (*) in het veld staat betekent dit dat een deel van de waarnemingen pas na expliciete toestemming van de bronhouder mag worden uitgeleverd. Het kan dus zijn dat in de standaardlevering niet alle waarnemingen worden geleverd die optellen tot de beknopte levering. Ook kan het zijn dat deze gegevens later worden geleverd.

Volledigheid onderzoek

Voor elke soortgroep is een indicatie gegeven hoe volledig een specifiek kilometerhok is onderzocht. Er wordt hierbij gewerkt met een normering in 5 klassen: (1) niet, (2) slecht, (3) redelijk onderzocht, (4) goed onderzocht en (5) onbepaald. De volledigheid van onderzoek wordt geautomatiseerd berekend voor alle soortgroepen, waarbij elk kilometerhok meedraait in een cyclus van berekeningen over geheel Nederland. De doorlooptijd van deze rekencyclus is in de praktijk 2 tot 3 weken voor alle kilometerhokken in Nederland. In de toelichting is per soortgroep aangegeven welke regels hierbij gehanteerd zijn en over welke periode.

[Download de toelichting](#)

Detailtering

Voor elke soortgroep is in de oppervlakteklassen 0-0.25 km² en groter dan 1 km² bepaald welk aandeel de waarnemingen bezetten. De basis voor deze berekening is het aantal waarnemingen: in de beschouwde periode; dat geheel of gedeeltelijk in het kilometerhok valt; waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden. De resultaten zijn in de drie genoemde klassen achter elkaar geplaatst en gescheiden door een slash- teken (/).

Onderzoeksperiode

De onderzoeksperiode betreft voor vrijwel alle beschreven soortgroepen de recente 10 afgeronde veldseizoenen. Alleen voor vaatplanten wordt een langere periode gehanteerd. In de loop van het kalenderjaar wordt de beschouwde periode dus steeds iets langer.

Bijlage 3 : Foto's bebouwing en omgeving







Bijlage 4 : Natuurbeheer Limburg

Heide 19, Roggel

Info



schaal

0 600 1200 1800m

22 maart 2017

Disclaimer


Op het gebruik van de door de provincie Limburg aan u verstrekte gegevens zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing.

1. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens kan niet worden gegarandeerd.
2. Het gebruik van de verstrekte gegevens geschiedt op eigen risico, de provincie Limburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de verstrekte gegevens.
3. De verstrekte gegevens mogen ter beschikking worden gesteld aan derden, onder voorwaarde dat deze gebruiksvoorwaarden door u aan de betreffende derden worden verstrekt.

Legenda van Natura 2000 Limburg

	Habitat Rietmijnen (HR)
	Habitatrichtlijn en Beschermd Natuurmonument (HR+BN)
	Vogelrichtlijngebieden (VR)
	Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VR+HR)
	Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en Beschermd Natuurmonument (VR+HR+BN)
	Ondergrondse kalksteengroeven (HR groene)

Bijlage 5 : Natuurdata provincie Limburg



blok 58-23-42

F
C
n
E
C

Actuele gegevens 3^e kartering

Vastgestelde broedvogels:

Hok 58-23-42

X,Y rechtsboven (NO): 192000,367000


X,Y linksonder (ZW): 191000,366000

	Rode Lijst soorten:	5	(11 territoria)
	Aandachtsoorten:	8	(15 territoria)
	Schaarse soorten:	25	(57 territoria)
	Algemene soorten:	24	

[naar kaart \(derde kartering\)](#)[naar tabel eerste kartering](#)[naar tabel tweede kartering](#)[naar tabel alle karteringen](#)

soort	aantal	soort	aantal
 Gele Kwikstaart	2	 Putter	1
 Kneu	4	 Scholekster	2
 Patrijs	1	 Tuinfluiter	1
 Veldleeuwerik	1	 Waterhoen	1
 Zomertortel	3	 Zwarte Kraai	4
 Boomleeuwerik	1	 Zwarte Roodstaart	6
 Geelgors	1		
 Roodborsttapuit	2		
 Boomklever	1		
 Boomkruiper	4		
 Ekster	5		
 Gekraagde Roodstaart	3		
 Grasmus	2		
 Grote Bonte Specht	2		
 Grote Lijster	1		
 Holenduif	5		
 Kievit	2		
 Kuifmees	1		
 Meerkooit	1		

Deze gegevens zijn verzameld in 2012.



blok **58-23-42**

P
C
n
D
D

Historische gegevens 2^e kartering

Vastgestelde broedvogels:

	Rode Lijst soorten:	5	(8 territoria)
	Aandachtsoorten:	6	(11 territoria)
	Schaarse soorten:	14	(29 territoria)
	Algemene soorten:	30	

Hok 58-23-42


X,Y rechtsboven (NO): 192000,367000

X,Y linksonder (ZW): 191000,366000

[naar kaart \(derde kartering\)](#)[naar tabel eerste kartering](#)[naar tabel derde kartering](#)[naar tabel alle karteringen](#)

soort	aantal
 Gele Kwikstaart	2
 Grauwe Vliegenvanger	1
 Matkop	1
 Veldleeuwerik	2
 Zomertortel	2
 Geelgors	3
 Boomkruiper	1
 Braamsluiper	1
 Buizerd	1
 Grote Bonte Specht	1
 Holenduif	7
 Waterhoen	2
 Zwarte Mees	1
 Zwarte Roodstaart	4

Deze gegevens zijn verzameld in 1999.



Actuele gegevens 3^e kartering

Vastgestelde planten:

- ▶ 4 Flora- en Faunawet soorten
- ▶ 21 Limburgse Lijst soorten
- ▶ 40 schaarse soorten

Hok 58-23-42

X,Y rechtsboven (NO): 192000,367000
 X,Y linksonder (ZW): 191000,366000

[naar kaart actuele kartering](#)
[naar tabel eerste kartering](#)
[naar tabel tweede kartering](#)

soort	soort
▶ Dotterbloem (<i>Caltha palustris</i>)	▶ Moerasspirea (<i>Filipendula ulmaria</i>)
▶ Grasklokje (<i>Campanula rotundifolia</i>)	▶ Moeraswalstro (<i>Galium palustre</i>)
▶ Kleine maagdenpalm (<i>Vinca minor</i>)	▶ Muurpeper (<i>Sedum acre</i>)
▶ Rapunzelklokje (<i>Campanula rapunculus</i>)	▶ Reigersbek s.s. (<i>Erodium cicutarium cicutarium</i>)
▶ Biezeknoppen (<i>Juncus conglomeratus</i>)	▶ Schapezuring (<i>Rumex acetosella</i>)
▶ Bosveldkers (<i>Cardamine flexuosa</i>)	▶ Scherpe zegge (<i>Carex acuta</i>)
▶ Drijvend fonteinkruid (<i>Potamogeton natans</i>)	▶ Watermunt (<i>Mentha aquatica</i>)
▶ Grijskruid (<i>Berteroa incana</i>)	▶ Wilde bertram (<i>Achillea ptarmica</i>)
▶ Hemelsleutel (<i>Sedum telephium</i> s.l.)	
▶ Kikkerbeet (<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>)	
▶ Klein vogelpootje (<i>Ornithopus perpusillus</i>)	
▶ Korenbloem (<i>Centaurea cyanus</i>)	
▶ Kruisbladige wolfsmelk (<i>Euphorbia lathyris</i>)	
▶ Pijlkruid (<i>Sagittaria sagittifolia</i>)	
▶ Postelein (<i>Portulaca oleracea</i>)	
▶ Rode kornoelje (<i>Cornus sanguinea</i>)	
▶ Schermhavikskruid (<i>Hieracium umbellatum</i>)	
▶ Veelwortelig kroos (<i>Spirodela polyrhiza</i>)	
▶ Wilde hyacint (<i>Hyacinthoides non-scripta</i>)	
▶ Wilde kardinaalsmuts (<i>Euonymus europaeus</i>)	
▶ Witte waterkers (<i>Nasturtium officinale</i>)	
▶ Zachte wikke (<i>Vicia villosa</i>)	
▶ Zandblauwtje (<i>Jasione montana</i>)	
▶ Bastaardpaardestaart (<i>Equisetum x litorale</i>)	
▶ Gele ganzebloem (<i>Glebionus segetum</i>)	
▶ Gewone veldbies (<i>Luzula campestris</i>)	
▶ Gewoon biggekruid (<i>Hypochaeris radicata</i>)	
▶ Grote klit (<i>Arctium lappa</i>)	
▶ Hertshoornweegbree (<i>Plantago coronopus</i>)	
▶ Jakobskruid (<i>Jacobaea vulgaris vulgaris</i>)	
▶ Lidrus (<i>Equisetum palustre</i>)	
▶ Moerasrolklaver (<i>Lotus pedunculatus</i>)	