

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Vergunde opzet 2018

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Maatschap A.F. Platenkamp en Y.C. Platenkamp-Mulder	Broekdijk 18-20, 7245 RP Laren

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	
Verschilberekening	RU87kh7MASPJ	
Datum berekening	Rekenjaar	Rekeninstellingen
05 maart 2018, 12:18	2018	Berekend voor Wnb.

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	-	-	-
NH ₃	7.004,70 kg/j	6.980,40 kg/j	-24,30 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
-	-

Toelichting

Verschilberekening

Locatie
Vergunde opzet
2018




Emissie
Vergunde opzet
2018

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Stal 1 Landbouw Stalemissies	636,90 kg/j	-
2	Stal 2 Landbouw Stalemissies	2.880,00 kg/j	-
3	Stal 5 Landbouw Stalemissies	847,80 kg/j	-
4	Stal 6 Landbouw Stalemissies	1.440,00 kg/j	-
5	Stal 7 voor Landbouw Stalemissies	576,00 kg/j	-
6	Stal 7 midden Landbouw Stalemissies	48,00 kg/j	-

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
	 Stal 7 achter Landbouw Stalemissies	576,00 kg/j	-

Locatie
Beoogde opzet



Emissie
Beoogde opzet

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Stal 1 Landbouw Stalemissies	636,90 kg/j	-
2	 Stal 2 Landbouw Stalemissies	2.880,00 kg/j	-
3	 Stal 5 Landbouw Stalemissies	823,50 kg/j	-
4	 Stal 6 Landbouw Stalemissies	1.440,00 kg/j	-
5	 Stal 7 voor Landbouw Stalemissies	576,00 kg/j	-
6	 Stal 7 midden Landbouw Stalemissies	48,00 kg/j	-

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
	 Stal 7 achter Landbouw Stalemissies	576,00 kg/j	-

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Sallandse Heuvelrug	0,49	0,49	- 0,00
Veluwe	>0,05	>0,05	- 0,00
Rijntakken	>0,05	>0,05	- 0,00
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	>0,05	>0,05	- 0,00
Bargerveen	>0,05	>0,05	- 0,00
Willinks Weust	>0,05	>0,05	- 0,00
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,10	0,10	- 0,00
Bekendelle	>0,05	>0,05	- 0,00
Wooldse Veen	>0,05	0,05	- 0,00
Dwingelderveld	>0,05	>0,05	- 0,00
De Wieden	>0,05	0,05	- 0,00
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,08	0,08	- 0,00
Korenburgerveen	>0,05	0,05	- 0,00
Mantingerzand	>0,05	>0,05	- 0,00
Mantingerbos	>0,05	>0,05	- 0,00
Dinkelland	0,06	0,06	- 0,00
Stelkampsveld	0,26	0,26	- 0,00
Witte Veen	0,08	0,08	- 0,00
Aamsveen	0,06	0,06	- 0,00
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,08	0,08	- 0,00
Landgoederen Oldenzaal	0,08	0,07	- 0,00

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Landgoederen Brummen	0,14	0,14	- 0,00
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,09	0,09	- 0,00
Boetelerveld	0,36	0,36	- 0,00
Engbertsdijksvenen	0,13	0,13	- 0,00
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,11	0,11	- 0,00
Lemselermaten	0,12	0,12	- 0,00
Lonnekermeer	0,14	0,14	- 0,00
Borkeld	1,18	1,18	- 0,00
Wierdense Veld	0,26	0,26	- 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitattype
(mol/ha/j)

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,49	0,49	- 0,00
H4030 Droge heiden	0,97	0,97	- 0,00
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,97	0,97	- 0,00
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,66	0,66	- 0,00
Lg09 Droog struisgrasland	0,41	0,41	- 0,00
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,35	0,35	- 0,00
H9999:42 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,53	0,53	- 0,00
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,53	0,53	- 0,00
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,81	0,81	- 0,00

Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00
L4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	>0,05	>0,05	- 0,00
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	- 0,00
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	>0,05	>0,05	- 0,00
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00
Lg09 Droog struisgrasland	>0,05	>0,05	- 0,00
Lg13 Bos van arme zandgronden	>0,05	>0,05	- 0,00
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	>0,05	>0,05	- 0,00
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	>0,05	>0,05	- 0,00
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	- 0,00
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	- 0,00
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	0,05	- 0,00
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	>0,05	- 0,00
ZGL4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	>0,05	- 0,00
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	- 0,00
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	- 0,00
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	0,06	0,06	- 0,00

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	- 0,00
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,06	- 0,00
ZGH4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	- 0,00
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,06	- 0,00
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	>0,05	- 0,00
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00
ZGLg09 Droog struisgrasland	>0,05	>0,05	- 0,00
ZGH9190 Oude eikenbossen	>0,05	>0,05	- 0,00
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	- 0,00

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	>0,05	>0,05	- 0,00
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	>0,05	0,05	- 0,00
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	>0,05	0,05	- 0,00
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	>0,05	0,05	- 0,00
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	>0,05	>0,05	- 0,00
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	>0,05	>0,05	- 0,00
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,07	0,07	- 0,00
ZGHg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	>0,05	>0,05	- 0,00
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	>0,05	>0,05	- 0,00
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	>0,05	>0,05	- 0,00
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,06	- 0,00
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,06	- 0,00 (-)
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,06	0,06	- 0,00
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	>0,05	>0,05	- 0,00
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	0,06	- 0,00
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07	0,07	- 0,00
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,08	0,08	- 0,00

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGHg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,13	0,13	- 0,00 (-)

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	>0,05	>0,05	- 0,00
H6120 Stroomdalgraslanden	0,06	0,06	- 0,00
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	>0,05	>0,05	- 0,00
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	>0,05	>0,05	- 0,00
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	>0,05	- 0,00

Bargerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	>0,05	>0,05	- 0,00
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	>0,05	>0,05	- 0,00
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	- 0,00
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	- 0,00
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,05	- 0,00
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	- 0,00

Willinks Weust

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	- 0,00
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	- 0,00
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	- 0,00
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,06	- 0,00

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	- 0,00
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,10	- 0,00
H4030 Droge heiden	0,09	0,09	- 0,00
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08	0,08	- 0,00
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,08	- 0,00
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,08	0,08	- 0,00
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,09	0,09	- 0,00
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	- 0,00
H7230 Kalkmoerassen	0,10	0,10	- 0,00
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10	0,10	- 0,00
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,12	- 0,00
H91Do Hoogveenbossen	0,12	0,12	- 0,00

Bekendelle

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	- 0,00
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	- 0,00
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00

Wooldse Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,05	- 0,00

Dwingelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg13 Bos van arme zandgronden	>0,05	>0,05	- 0,00
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	>0,05	>0,05	- 0,00
L4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	>0,05	>0,05	- 0,00
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	>0,05	- 0,00
Lg04 Zuur ven	>0,05	>0,05	- 0,00
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	>0,05	>0,05	- 0,00
Lg05 Grote-zeggenmoeras	>0,05	>0,05	- 0,00
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	- 0,00
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	0,05	- 0,00
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	>0,05	- 0,00
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	>0,05	>0,05	- 0,00
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	- 0,00
ZGH91Do Hoogveenbossen	>0,05	>0,05	- 0,00
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,06	- 0,00

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,08	0,08	- 0,00
H2330 Zandverstuivingen	0,08	0,08	- 0,00
H6120 Stroomdalgraslanden	0,08	0,08	- 0,00
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,08	0,08	- 0,00
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08	0,08	- 0,00
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,08	- 0,00
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,08	0,08	- 0,00
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,09	- 0,00
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,09	- 0,00
H9999:39 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,09	0,09	- 0,00
H4030 Droge heiden	0,11	0,11	- 0,00
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,10	0,10	- 0,00
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,10	0,10	- 0,00
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	0,09	- 0,00
H9190 Oude eikenbossen	0,13	0,12	- 0,00
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,12	- 0,00
ZGH4030 Droge heiden	0,12	0,12	- 0,00
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,11	- 0,00
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,11	- 0,00

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17	0,17	- 0,00
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08	0,08	- 0,00
H3160 Zure vennen	0,12	0,12	- 0,00
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,13	0,13	- 0,00
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,17	0,17	- 0,00
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,15	0,15	- 0,00
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,24	0,23	- 0,00

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,05	- 0,00
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	- 0,00
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	- 0,00
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	- 0,00
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	- 0,00
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	- 0,00
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	- 0,00
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,07	0,07	- 0,00
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,06	- 0,00
H7210 Galigaanmoerassen	0,08	0,08	- 0,00

Mantingerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	>0,05	- 0,00
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	>0,05	- 0,00
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	- 0,00
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00

Mantingerbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	- 0,00

Dinkelland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	- 0,00
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	- 0,00
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	- 0,00
ZGH4030 Droge heiden	0,08	0,08	- 0,00
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,08	0,08	- 0,00
H6120 Stroomdalgraslanden	0,08	0,08	- 0,00

Stelkampsveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,26	0,26	- 0,00
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26	0,26	- 0,00
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	0,24	- 0,00
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	0,24	- 0,00
H6410 Blauwgraslanden	0,24	0,24	- 0,00
H4030 Droge heiden	0,24	0,24	- 0,00
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,24	0,23	- 0,00
H7230 Kalkmoerassen	0,16	0,16	- 0,00

Witte Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	- 0,00
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	- 0,00
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,07	- 0,00
H3160 Zure vennen	0,09	0,09	- 0,00
H91Do Hoogveenbossen	0,09	0,09	- 0,00
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10	0,10	- 0,00

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	- 0,00
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,07	0,07	- 0,00
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,07	- 0,00
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	- 0,00
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	- 0,00
H6410 Blauwgraslanden	0,08	0,08	- 0,00
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	0,09	- 0,00
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,09	- 0,00
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,09	- 0,00
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,11	- 0,00
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,11	- 0,00
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,09	- 0,00

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,08	- 0,00
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	- 0,00
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	- 0,00
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	- 0,00
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,08	0,08	- 0,00
H6410 Blauwgraslanden	0,08	0,08	- 0,00
H7230 Kalkmoerassen	0,08	0,08	- 0,00
H91Do Hoogveenbossen	0,09	0,09	- 0,00
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,11	0,11	- 0,00

Landgoederen Oldenzaal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,08	0,07	- 0,00
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	- 0,00
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	- 0,00
ZGHg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,11	0,11	- 0,00
Hg999:50 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4o3o)	0,10	0,10	- 0,00
ZGHg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	0,11	- 0,00

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,14	- 0,00
ZGH313o Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00
H4o1oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,14	- 0,00
H313o Zwakgebufferde vennen	0,14	0,14	- 0,00
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,14	0,14	- 0,00
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,12	- 0,00
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,15	0,15	- 0,00
H641o Blauwgraslanden	0,13	0,13	- 0,00

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,09	0,09	- 0,00
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,11	- 0,00
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,11	- 0,00
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,11	- 0,00
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,11	0,11	- 0,00
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	- 0,00
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,10	- 0,00
H7230 Kalkmoerassen	0,10	0,10	- 0,00
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	- 0,00
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	- 0,00
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,10	- 0,00
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,09	- 0,00
ZGH4030 Droge heiden	0,12	0,12	- 0,00
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,12	0,11	- 0,00
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,10	- 0,00
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,10	0,10	- 0,00
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,11	- 0,00
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,15	- 0,00

Boetelerveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,36	0,36	- 0,00
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,37	0,37	- 0,00
H6410 Blauwgraslanden	0,34	0,34	- 0,00
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,25	0,25	- 0,00
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,45	0,45	- 0,00
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,36	0,35	- 0,00
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,56	0,56	- 0,00

Engbertsdijksvenen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,14	0,14	- 0,00
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,13	0,13	- 0,00
H4030 Droge heiden	0,13	0,13	- 0,00

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,11	- 0,00
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,12	- 0,00
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,12	0,12	- 0,00
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,15	- 0,00

Lemselermaten

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,12	- 0,00
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,12	- 0,00
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,12	- 0,00
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,12	0,12	- 0,00
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,15	0,15	- 0,00
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,15	- 0,00
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,14	0,14	- 0,00
H7230 Kalkmoerassen	0,17	0,17	- 0,00

Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	0,14	- 0,00
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,14	- 0,00
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,14	- 0,00
H4030 Droge heiden	0,14	0,14	- 0,00
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	0,13	- 0,00
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,14	0,14	- 0,00
H3160 Zure vennen	0,21	0,21	- 0,00

Borkeld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,18	1,18	- 0,00
H4030 Droge heiden	1,18	1,18	- 0,00
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,91	1,91	- 0,00
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,18	1,17	- 0,00
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,23	1,23	- 0,00
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,78	0,78	- 0,00
H3160 Zure vennen	0,73	0,73	- 0,00

Wierdense Veld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,26	0,26	- 0,00
H4030 Droge heiden	0,26	0,26	- 0,00
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,31	0,31	- 0,00
H6230 Heischrale graslanden	0,35	0,34	- 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
resterende
gebieden
(mol/ha/j)


Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Ahlder Pool	>0,05	0,05	- 0,00 (-)
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,07	0,07	- 0,00 (-)
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,07	0,07	- 0,00 (-)
Ems	>0,05	0,05	- 0,00 (-)
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Berkel	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Bentheimer Wald	0,06	0,06	- 0,00 (-)
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Untere Haseniederung	>0,05	0,05	- 0,00 (-)
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	>0,05	0,05	- 0,00 (-)
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	>0,05	0,05	- 0,00 (-)
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,06	0,06	- 0,00 (-)
Liesner Wald	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Berger Keienvenn	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Samerrott	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Herrenholz und Schöppinger Berg	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Gildehauser Venn	>0,05	0,05	- 0,00 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Heseper Moor, Engdener Wüste	>0,05	0,05	- 0,00 (-)
Engdener Wüste	>0,05	0,05	- 0,00 (-)
Wisseler Dünen	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Feuchtwiese Ochtrup	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Syen-Venn	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Rünenberger Venn	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Dornicksche Ward	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
NSG Salmorth, nur Teilfläche	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,06	>0,05	- 0,00 (-)
Gutswald Stovern	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Weiher am Syenvenn	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Esterfelder Moor bei Meppen	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	>0,05	0,05	- 0,00 (-)
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,08	0,08	- 0,00 (-)
NSG Emmericher Ward	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)
Harskamp	0,06	0,06	- 0,00 (-)
Schwattet Gatt	0,07	0,07	- 0,00 (-)
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,07	0,07	- 0,00 (-)
Tillenberge	0,07	0,07	- 0,00 (-)
Wacholderheide Hörsteloe	0,07	0,07	- 0,00 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,08	0,07	- 0,00 (-)
Kleingewässer Achterberg	0,08	0,08	- 0,00 (-)
Itterbecker Heide	0,08	0,08	- 0,00 (-)
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,12	0,12	- 0,00 (-)


* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Vergunde opzet
2018



Naam **Stal 1**
 Locatie (X,Y) **222975, 472343**
 Uitstoothoogte **9,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **636,90 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2010.02.V3)	965	NH ₃	0,450	434,25 kg/j
	D 3.2.10.1	gedeeltelijk roostervloer; bollevloerhok met betonnen morsrooster en metalen driekantrooster; emitterend mestoppervlak maximaal 0,22 m ² per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2001.27.V3)	965	NH ₃	1,400	1.351,00 kg/j
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2010.02.V3)		NH ₃		202,65 kg/j




Naam **Stal 2**
 Locatie (X,Y) **222934, 472341**
 Uitstoothoogte **4,2 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **2.880,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.1	gedeeltelijk roostervloer; gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2001.23.V1)	640	NH ₃	4,500	2.880,00 kg/j




Naam **Stal 5**
 Locatie (X,Y) **222998, 472371**
 Uitstoothoogte **9,2 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **847,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2)	1.884	NH ₃	0,450	847,80 kg/j




Naam **Stal 6**
Locatie (X,Y) **222888, 472244**
Uitstoothoogte **4,2 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.440,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	480	NH ₃	3,000	1.440,00 kg/j



Naam **Stal 7 voor**
Locatie (X,Y) **222854, 472237**
Uitstoothoogte **3,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **576,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	192	NH ₃	3,000	576,00 kg/j




Naam **Stal 7 midden**
Locatie (X,Y) **222876, 472221**
Uitstoothoogte **4,9 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **48,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	16	NH ₃	3,000	48,00 kg/j




Naam **Stal 7 achter**
Locatie (X,Y) **222892, 472210**
Uitstoothoogte **3,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **576,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	192	NH ₃	3,000	576,00 kg/j

Emissie
(per bron)
Beoogde opzet

Naam **Stal 1**
 Locatie (X,Y) **222975, 472343**
 Uitstoothoogte **9,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **636,90 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2010.02.V3)	965	NH ₃	0,450	434,25 kg/j
	D 3.2.10.1	gedeeltelijk roostervloer; bollevloerhok met betonnen morsrooster en metalen driekantrooster; emitterend mestoppervlak maximaal 0,22 m ² per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2001.27.V3)	965	NH ₃	1,400	1.351,00 kg/j
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)		NH ₃		202,65 kg/j




Naam **Stal 2**
 Locatie (X,Y) **222934, 472341**
 Uitstoothoogte **4,2 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **2.880,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.1	gedeeltelijk roostervloer; gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2001.23.V1)	640	NH ₃	4,500	2.880,00 kg/j




Naam **Stal 5**
 Locatie (X,Y) **222998, 472371**
 Uitstoothoogte **7,2 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **823,50 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2)	1.830	NH ₃	0,450	823,50 kg/j




Naam **Stal 6**
Locatie (X,Y) **222888, 472244**
Uitstoothoogte **4,2 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.440,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	480	NH ₃	3,000	1.440,00 kg/j




Naam **Stal 7 voor**
Locatie (X,Y) **222854, 472237**
Uitstoothoogte **3,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **576,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	192	NH ₃	3,000	576,00 kg/j



Naam **Stal 7 midden**
Locatie (X,Y) **222876, 472221**
Uitstoothoogte **4,9 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **48,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	16	NH ₃	3,000	48,00 kg/j



Naam **Stal 7 achter**
Locatie (X,Y) **222892, 472210**
Uitstoothoogte **3,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **576,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	192	NH ₃	3,000	576,00 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171215_64190d2d2b

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>