

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Wnb 2015

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
---------------	--------------------

Leveroyseweg 10, 6093 NE Heythuysen

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
--------------	----------------

Vleeskuikens

RW1GTPJGndu7

Datum berekening	Rekenjaar	Rekeninstellingen
------------------	-----------	-------------------

16 april 2018, 15:40

2018

Berekend voor Wnb.

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verskil
NOx	-	-	-
NH ₃	10.599,50 kg/j	5.051,05 kg/j	-5.548,45 kg/j

Resultaten

Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
-	-

Toelichting

verschilberekening referentiesituatie en beoogde situatie ouderdieren legrassen

Locatie
Wnb 2015



Emissie
Wnb 2015

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Schapenstal Landbouw Stalemissies	7,00 kg/j	-
2	 Stal A Landbouw Stalemissies	2.376,25 kg/j	-
3	 Stal B Landbouw Stalemissies	2.738,75 kg/j	-
4	 Stal C Landbouw Stalemissies	2.738,75 kg/j	-
5	 Stal D Landbouw Stalemissies	2.738,75 kg/j	-

Locatie
aangevraagd plan



Emissie
aangevraagd plan

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Schapenstal Landbouw Stalemissies	7,00 kg/j	-
2	 Stal A Landbouw Stalemissies	1.124,10 kg/j	-
3	 Stal B Landbouw Stalemissies	1.306,65 kg/j	-
4	 Stal C Landbouw Stalemissies	1.306,65 kg/j	-
5	 Stal D Landbouw Stalemissies	1.306,65 kg/j	-

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	>0,05	0,02	- 0,03
Kempenland-West	>0,05	0,02	- 0,03
Oeffelter Meent	>0,05	0,02	- 0,03
Maasduinen	>0,05	0,02	- 0,03
Geuldal	>0,05	0,02	- 0,03
Bemelerberg & Schiepersberg	>0,05	0,02	- 0,03
Savelsbos	>0,05	0,02	- 0,03
Geleenbeekdal	>0,05	0,02	- 0,03
Kampina & Oisterwijkse Vennen	>0,05	0,02	- 0,03
Sint Pietersberg & Jekerdal	>0,05	0,02	- 0,03
Rijntakken	>0,05	0,02	- 0,03
Brunssummerheide	>0,05	0,02	- 0,03
Bunder- en Elslooërbos	>0,05	0,02	- 0,03
De Bruuk	>0,05	0,02	- 0,03
Kunderberg	>0,05	0,03	- 0,03
Zeldersche Driessen	>0,05	0,03	- 0,03
Sint Jansberg	>0,05	0,03	- 0,03
Strabrechtse Heide & Beuven	0,06	0,03	- 0,03
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,08	0,04	- 0,04
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,08	0,04	- 0,04
Roerdal	0,12	0,06	- 0,06 (- 0,10)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Boschhuizerbergen	0,13	0,06	- 0,06
Meinweg	0,14	0,07	- 0,07
Groote Peel	0,18	0,09	- 0,09
Swalmdal	0,34	0,16	- 0,17 (- 0,28)
Sarsven en De Banen	0,65	0,32	- 0,33 (- 0,36)
Leudal	1,37	0,66	- 0,71 (- 1,10)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitattype
(mol/ha/j)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	>0,05	0,02	- 0,03
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,02	- 0,03
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,02	- 0,03
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,02	- 0,03
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,02	- 0,03
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,02	- 0,03
H3160 Zure vennen	>0,05	0,02	- 0,03
Lg09 Droog struisgrasland	>0,05	0,02	- 0,03
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,03
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,03	- 0,03
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	0,03	- 0,03
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,03	- 0,03 (-)
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,03	- 0,04
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,07	0,03	- 0,04
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,07	0,04	- 0,04 (- 0,05)
ZGH3160 Zure vennen	0,08	0,04	- 0,04
H9190 Oude eikenbossen	0,08	0,04	- 0,04

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,08	0,04	- 0,04
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10	0,05	- 0,05
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,15	0,07	- 0,08

Kempenland-West

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,02	- 0,03
H4030 Droge heiden	>0,05	0,02	- 0,03
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,02	- 0,03
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,02	- 0,03
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,02	- 0,03
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,02	- 0,03
Lg03 Zwakgebufferde sloot	>0,05	0,03	- 0,03
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,03

Oeffelter Meent

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	0,02	- 0,03
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	0,02	- 0,03

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,02	- 0,03
H3160 Zure vennen	>0,05	0,02	- 0,03
H4030 Droge heiden	>0,05	0,02	- 0,03
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,03
L4030 Droge heiden	>0,05	0,03	- 0,03
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	>0,05	0,03	- 0,03
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,06	0,03	- 0,03
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,03	- 0,03
H2330 Zandverstuivingen	0,07	0,03	- 0,03
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,03	- 0,03
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07	0,03	- 0,04
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,03	- 0,04
Hg1Do Hoogveenbossen	0,07	0,04	- 0,04
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,08	0,04	- 0,04
Lg04 Zuur ven	0,08	0,04	- 0,04
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,04	- 0,04
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,04	- 0,04
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,08	0,04	- 0,04

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,09	0,04	- 0,05
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,11	>0,05	- 0,06
H612o Stroomdalgraslanden	0,13	0,06	- 0,07
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	0,07	- 0,08
Hg19o Oude eikenbossen	0,18	0,09	- 0,09

Geuldal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,02	- 0,03
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	0,02	- 0,03
Hg11o Veldbies-beukenbossen	>0,05	0,02	- 0,03
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	>0,05	0,02	- 0,03
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,02	- 0,03
H621o Kalkgraslanden	>0,05	0,02	- 0,03
H722o Kalktufbronnen	>0,05	0,03	- 0,03
H651oA Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	0,03	- 0,03
H723o Kalkmoerassen	0,08	0,04	- 0,04

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	0,02	- 0,03
ZGHg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	0,02	- 0,03
H6210 Kalkgraslanden	>0,05	0,02	- 0,03
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	>0,05	0,02	- 0,03
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	>0,05	0,02	- 0,03
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,06	0,03	- 0,03
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,07	0,04	- 0,04

Savelsbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	0,02	- 0,03
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,02	- 0,03
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	0,03	- 0,03
H6210 Kalkgraslanden	0,07	0,03	- 0,03

Geleenbeekdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH _{91EoC} Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,02	- 0,03
H _{91EoC} Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,02	- 0,03
H ₉₁₂₀ Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,02	- 0,03
H _{9160B} Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	0,02	- 0,03
H ₇₂₃₀ Kalkmoerassen	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH _{9160B} Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	0,03	- 0,03
ZGH ₉₁₂₀ Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,03	- 0,03

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H _{91EoC} Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,02	- 0,03
H ₃₁₆₀ Zure vennen	>0,05	0,02	- 0,03
L ₉₀₄ Zuur ven	>0,05	0,02	- 0,03
L ₉₀₃ Zwakgebufferde sloot	>0,05	0,02	- 0,03
H _{4010A} Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,02	- 0,03
L _{4010A} Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,02	- 0,03
H _{7110B} Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	0,02	- 0,03
H ₃₁₁₀ Zeer zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,03
L ₄₀₃₀ Droge heiden	>0,05	0,03	- 0,03

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	0,02	- 0,03
H621o Kalkgraslanden	>0,05	0,02	- 0,03
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	0,02	- 0,03
H611o Pionierbegroeiingen op rotsbodem	>0,05	0,03	- 0,03
H623odkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,06	0,03	- 0,03

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	>0,05	0,02	- 0,03
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	>0,05	0,02	- 0,03
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,06	0,03	- 0,03
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,06	0,03	- 0,03

Brunssummerheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	>0,05	0,02	- 0,03
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,02	- 0,03
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,02	- 0,03
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,02	- 0,03
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,02	- 0,03
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	0,03	- 0,03
H91Do Hoogveenbossen	0,07	0,03	- 0,03
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,07	0,03	- 0,04
H3160 Zure vennen	0,07	0,04	- 0,04
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,07	0,04	- 0,04
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,10	>0,05	- 0,05 (-)

Bunder- en Elslooërbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	0,02	- 0,03
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,03	- 0,03
H7220 Kalktufbronnen	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	0,03	- 0,03 (- 0,04)
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,09	0,04	- 0,04

De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,02	- 0,03

Kunderberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	0,03	- 0,03

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	0,03	- 0,03
H91Fo Droge hardhoutooibossen	>0,05	0,03	- 0,03
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,03	- 0,03
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	0,03	- 0,03

Sint Jansberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,03	- 0,03
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,04	- 0,04
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,04	- 0,04
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,08	0,04	- 0,04

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4030 Droge heiden	0,06	0,03	- 0,03
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,03	- 0,03
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,03	- 0,03
H3160 Zure vennen	0,06	0,03	- 0,03
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,03	- 0,03
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,03	- 0,03
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,06	0,03	- 0,03
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,08	0,04	- 0,04
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,04	- 0,05 (- 0,06)

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,08	0,04	- 0,04
H7210 Galigaanmoerassen	0,09	0,04	- 0,04 (- 0,05)
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,09	0,04	- 0,04
H2330 Zandverstuivingen	0,09	0,04	- 0,05
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,04	- 0,05
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,05	- 0,05
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,05	- 0,05
Lg09 Droog struisgrasland	0,10	0,05	- 0,05
L4030 Droge heiden	0,11	0,06	- 0,06
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,11	>0,05	- 0,06 (- 0,10)
H9190 Oude eikenbossen	0,12	0,06	- 0,06
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,06	- 0,06
H91Do Hoogveenbossen	0,19	0,09	- 0,10

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,04	- 0,04
Lg04 Zuur ven	0,14	0,07	- 0,07
L7120 Herstellende hoogvenen	0,15	0,07	- 0,08
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,16	0,08	- 0,08
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,23	0,11	- 0,12
H4030 Droge heiden	0,24	0,12	- 0,12
Lg09 Droog struisgrasland	0,34	0,16	- 0,17
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,39	0,19	- 0,20

Roerdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,06	- 0,06 (- 0,10)
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,13	0,06	- 0,07 (- 0,10)
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,22	0,11	- 0,11 (- 0,12)
Hg1Do Hoogveenbossen	0,22	0,11	- 0,11 (- 0,18)

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2330 Zandverstuivingen	0,13	0,06	- 0,06
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,13	0,06	- 0,06
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,13	0,06	- 0,06
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	0,06	- 0,07
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,14	0,07	- 0,07

Meinweg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,14	0,07	- 0,07
H4030 Droge heiden	0,14	0,07	- 0,08
Lg09 Droog struisgrasland	0,15	0,07	- 0,08
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,07	- 0,08
L4030 Droge heiden	0,15	0,07	- 0,08
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,18	0,09	- 0,09
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,09	- 0,10
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,19	0,09	- 0,10
H3160 Zure vennen	0,19	0,09	- 0,10
H91Do Hoogveenbossen	0,19	0,09	- 0,10
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,21	0,10	- 0,11 (- 0,12)
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,21	0,10	- 0,11
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,29	0,14	- 0,15
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,33	0,16	- 0,17

Groote Peel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,18	0,09	- 0,09
L4030 Droge heiden	0,19	0,09	- 0,10
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,21	0,10	- 0,11
Lg04 Zuur ven	0,23	0,11	- 0,11
H4030 Droge heiden	0,28	0,14	- 0,14
L7120 Herstellende hoogvenen	0,30	0,15	- 0,15

Swalmdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,34	0,16	- 0,17 (- 0,28)
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,47	0,23	- 0,24 (- 0,30)
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,86	0,41	- 0,44

Sarsven en De Banen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,65	0,32	- 0,33 (- 0,42)
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,70	0,34	- 0,36
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,83	0,40	- 0,42
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,92	0,45	- 0,47

Leudal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,37	0,66	- 0,71 (- 1,10)
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	2,35	1,17	- 1,19
ZGHg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	2,95	1,46	- 1,50

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
resterende
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Bokrijk en omgeving	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Ronde Put	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
De Demervallei	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Demervallei	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Gartroper Mühlenbach	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Kalflack	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Die Spey	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Hammerberg	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Overgang Kempen-Haspengouw	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Ilvericher Altrheinschlinge	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Vijvercomplex van Midden Limburg	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Brander Wald	>0,05	0,02	- 0,03 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Dämmer Wald	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Kaninchenberge	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Indemündung	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Voerstreek	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
NSG Rheinaue Walsum	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Bachsystem des Wienbaches	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	>0,05	0,02	- 0,03 (-)


Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Teverener Heide	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
De Maten	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
De Maten	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
NSG Weseler Aue	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Lichtenhagen	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Lindenberger Wald	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
NSG Rheinvorland bei Perrich	>0,05	0,02	- 0,03 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Rur von Obermaubach bis Linnich	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Wurmtal südlich Herzogenrath	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Grensmaas	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Köllnischer Wald	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Postwegmoore u. Rütterberg-Nord	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Münsterbachtal, Münsterbusch	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Schwarzes Wasser	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Steinbach	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Lippeaue	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Wurmtal nördlich Herzogenrath	>0,05	0,02	- 0,03 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
NSG Salmorth, nur Teilfläche	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Uedemer Hochwald	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Grosses Veen	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Ueberanger Mark	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Heidesee in der Kirchheller Heide	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Dornicksche Ward	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Wisseler Dünen	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
NSG Emmericher Ward	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Stollbach	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
NSG Kranenburger Bruch	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Reichswald	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Egelsberg	0,06	0,03	- 0,03 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Fleuthkuhlen	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Niederkamp	0,07	0,04	- 0,04 (-)
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,08	0,04	- 0,04 (-)
Tote Rahm	0,08	0,04	- 0,04 (-)
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Staatsforst Rheurdt / Littard	0,10	0,05	- 0,05 (-)
Nette bei Vinkrath	0,11	>0,05	- 0,06 (-)
Schaagbachtal	0,11	0,06	- 0,06 (-)
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,12	0,06	- 0,06 (-)
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	0,13	0,06	- 0,07 (-)
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach	0,17	0,08	- 0,09 (-)
Lüsekamp und Boschbeek	0,19	0,09	- 0,10 (-)
Hangmoor Damerbruch	0,22	0,11	- 0,11 (-)
Elmpter Schwalmbruch	0,24	0,11	- 0,12 (-)
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	0,26	0,13	- 0,14 (-)
Meinweg mit Ritzroder Dünen	0,27	0,13	- 0,14 (-)

- * Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Wnb 2015


Naam **Schapenstal**
Locatie (X,Y) **188818, 362474**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **7,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)	10	NH ₃	0,700	7,00 kg/j




Naam **Stal A**
Locatie (X,Y) **188827, 362514**
Uitstoothoogte **1,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.376,25 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	9.505	NH ₃	0,250	2.376,25 kg/j




Naam **Stal B**
Locatie (X,Y) **188799, 362497**
Uitstoothoogte **1,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.738,75 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	10.955	NH ₃	0,250	2.738,75 kg/j




Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **188776, 362493**
Uitstoothoogte **1,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.738,75 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	10.955	NH ₃	0,250	2.738,75 kg/j



Naam **Stal D**
Locatie (X,Y) **188754, 362502**
Uitstoothoogte **5,1 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.738,75 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	10.955	NH ₃	0,250	2.738,75 kg/j

Emissie
(per bron)
aangevraagd plan

Naam **Schapenstal**
 Locatie (X,Y) **188818, 362474**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **7,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)	10	NH ₃	0,700	7,00 kg/j




Naam **Stal A**
 Locatie (X,Y) **188827, 362514**
 Uitstoothoogte **1,8 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **1.124,10 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.9.2	grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen; grondhuisvesting met enkele buis onder de beun aan weerszijden van het legnest (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2011.09.V1)	7.494	NH ₃	0,150	1.124,10 kg/j




Naam **Stal B**
Locatie (X,Y) **188799, 362497**
Uitstoothoogte **1,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.306,65 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.9.2	grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen; grondhuisvesting met enkele buis onder de beun aan weerszijden van het legnest (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2011.09.V1)	8.711	NH ₃	0,150	1.306,65 kg/j



Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **188776, 362493**
Uitstoothoogte **4,9 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.306,65 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.9.2	grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen; grondhuisvesting met enkele buis onder de beun aan weerszijden van het legnest (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2011.09.V1)	8.711	NH ₃	0,150	1.306,65 kg/j



Naam **Stal D**
Locatie (X,Y) **188754, 362502**
Uitstoothoogte **4,9 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.306,65 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.9.2	grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen; grondhuisvesting met enkele buis onder de beun aan weerszijden van het legnest (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2011.09.V1)	8.711	NH ₃	0,150	1.306,65 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171215_64190d2d2b

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>