

Soort (broedvogel)	Categorie
Huismus	1
Kerkuil	1
Steenuil	1
Aalscholver	2
Blauwe Reiger	2
Dwergstern	2
Gierzwaluw	2
Grote Stern	2
Grote Zilverreiger	2
Huiszwaluw	2
Lepelaar	2
Noordse Stern	2
Purperreiger	2
Ringmus	2
Roek	2
Stormmeeuw	2
Zwarte Stern	2
Zwartkopmeeuw	2
Bosuil	3
Grote Gele Kwikstaart	3
Ijsvogel	3
Oehoe	3
Ooievaar	3
Raaf	3
Slechtvalk	3
Torenavalk	3
Zwarte Specht	3
Boomvalk	4
Buizerd	4
Draaihals	4
Havik	4
Ransuil	4
Sperwer	4
Wespendief	4
Zeearend	4
Zwarte Wouw	4
Bergeend	5
Blauwe Kiekendief	5
Boerenzwaluw	5
Bontbekplevier	5
Eider	5
Gekraagde Roodstaart	5
Glanskop	5
Grote Mantelmeeuw	5
Grutto	5
Kleine Bonte Specht	5
Kleine Mantelmeeuw	5
Kokmeeuw	5
Kraanvogel	5
Middelste Bonte Specht	5

Oeverzwaluw	5
Paapje	5
Ruigpootuil	5
Scholekster	5
Spreeuw	5
Strandplevier	5
Visdief	5
Zilvermeeuw	5

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin terugkeren naar de plaats van broeden.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die terugkeren naar de plaats van broeden.
4. Nesten van vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of slechts kort verhuizen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor beschermd. Echter, nesten van categorie 5-soorten zijn wél jaarrond beschermd als zwaarwettig beschermd.

het gehele seizoen:

bruik zijn als vaste rust-en verblijfplaats (voorbeeld: huismus, kerkuil, steenuil).

in zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nest
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden vo
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).

r hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikk
egende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Daarom is bij aantreffen van een r

tplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: aalscholver, roek, gierzwaluw).
or de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, torenvalk, sleg
ken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Deze zijn buiten het broedseizo
nest van een categorie 5-soort te allen tijde een omgevingscheck noodzakelijk.

chtvalk).

oen niet