

Vleermuisonderzoek aan de Dorpstraat 52 te Bemmelen

Aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming



Colofon

Status: Definitief

Project: BE/2020/143

Datum: 30 oktober 2020

Samensteller(s): ing. L.Pieterman

Collegiale toets: ir. ing. K.J. Rebergen

Opdrachtgever:



BURO SRO B.V.
Sweerts de Landasstraat 50
6814 DG Arnhem

Contactpersoon: Mw. J. Jentink

Disclaimer

Blom Ecologie B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie B.V.

© Blom Ecologie B.V./ Buro SRO

Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom Ecologie B.V. worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie, openbaarmaking en elke andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is samengesteld.

Inhoud

1 Inleiding	5
1.1 Aanleiding en doel	5
1.2 Plangebied	6
1.3 Werkzaamheden	7
1.4 Te verwachten soorten en functies	7
1.5 Kader Wet natuurbescherming	8
2 Methode	9
2.1 Theoretisch kader	9
2.2 Praktische uitvoering	10
2.3 Inventarisaties	12
2.4 Specifieke omstandigheden	13
3 Resultaten	14
3.1 Vleermuizen	14
3.4 Overige soorten	15
4 Conclusie	16
4.1 Vleermuizen	16
4.2 Overige soorten	16
4.3 Vervolgstep(en)	16
5 Bronnen.....	17
Bijlage 1 Overzicht waarnemingen.....	18

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Aan de Dorpsstraat 52 te Bommel is een horecagelegenheid en voormalige feestzaal 'Het Wapen van Bommel' gesitueerd. De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing binnen de planlocatie te saneren ten behoeve van de realisatie van een appartementencomplex met ruimte voor 21 appartementen. Het bestemmingsplan voorziet niet in de beoogde ontwikkeling en dient derhalve te worden gewijzigd van 'horeca' naar 'wonen'.

Gezien de beoogde ingreep mogelijk leidt tot de aantasting van beschermde natuurwaarden is een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de potentie van de planlocatie en mogelijke negatieve effecten ten gevolge van de beoogde ingreep (Visschers, 2020).



Figuur 1.1 De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan de Dorpsstraat 52 te Bommel (bron kaartmateriaal: arcgis.com).

Op basis van het oriënterende onderzoek kon de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen, nestplaatsen of een essentieel leefgebied van huismus, gierzwaluw en vleermuizen niet worden uitgesloten. Om vast te stellen of de te saneren bebouwing daadwerkelijk een functie heeft voor vorengenoemde soorten was aanvullend onderzoek noodzakelijk. Buro SRO B.V. heeft Blom Ecologie B.V. verzocht dit aanvullend onderzoek uit te voeren. In voorliggende rapportage worden de bevindingen beschreven.

Onderzoeksdoel

In dit aanvullende onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen centraal gesteld:

- Zijn vleermuizen aanwezig in het plangebied?
- Op welke wijze maken de vleermuizen gebruik van het plangebied? Zijn in het plangebied nesten en/of vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig?
- Hebben de voorgenomen activiteiten een negatief effect op de voorkomende soorten en/of de functionaliteit van de nesten en/of verblijfplaatsen en leefomgeving van vleermuizen?

1.2 Plangebied

De planlocatie is gelegen aan de Dorpsstraat 52 te Bommel (figuur 1.2). Binnen de planlocatie is een voormalige feestzaal aanwezig. In het verleden was de feestzaal onderdeel van de naastgelegen horecagelegenheid 'Het Wapen van Bommel' welke wordt aangeduid met het adres: Dorpsstraat 52c. Deze horecagelegenheid blijft behouden. Derhalve betreft de planlocatie enkel de feestzaal en het omliggend terrein aan de west-, noord-, en oostzijde. De te saneren feestzaal is opgetrokken uit gemetselde muren met spouw en draagt een pannendak. Het pand is twee bouwlagen hoog. In de gevels zijn op enkele plaatsen open stootvoegen en scheuren aanwezig welke allen zijn afgedicht met pur. Behoudens een border met struiken en een haagje aan de oostzijde van het pand, is het omliggend terrein volledig bestraat. De verharding aan de noord- en westzijde wordt gebruikt als parkeerplaats.

Het gebouw is opgetrokken uit gemetselde muren. Het gebouw heeft een spouwmuur en een aantal open stootvoegen. Het dak betreft een platbitumen dak met een metalen daklijst, houten boeiboord en anti-klimbeveiliging. In het rapport: 'Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en fauna aan de Dorpsstraat 52 te Bommel' is het plangebied en de omgeving nader toegelicht (Visschers, 2020).



Figuur 1.2 De bebouwing binnen de planlocatie betreft een voormalig feestzaal.

1.3 Werkzaamheden

De beoogde ontwikkeling betreft de sloop van de huidige bebouwing en de realisatie van een appartementencomplex met ruimte voor 21 appartementen. Ten behoeve van de ontwikkeling dient het bestemmingplan te worden aangepast. Het betreft een functieverandering van 'horeca' naar 'wonen'. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten:

- saneren van bebouwing: algemene sloopwerkzaamheden en afvoer sloopmateriaal;
- verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen: graafwerkzaamheden, transport (afvoer) van materiaal en groen;
- egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport;
- realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden;
- revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en hoveniers) werkzaamheden.

1.4 Te verwachten soorten en functies

Uit het oriënterend onderzoek (Visschers, 2020) is gebleken dat de bebouwing binnen de planlocatie geschikt is als verblijfplaats van vleermuizen (tabel 1.1). De bebouwing binnen de planlocatie is geschikt als verblijfplaatsen van vleermuizen in de vorm van zomer-, kraam- en paarverblijfplaatsen voor gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis. Wegens het beperkte thermisch bufferend vermogen van de bebouwing is het voorkomen van massawinterverblijfplaatsen van vleermuizen uitgesloten. Daarnaast is de bebouwing geschikt als nest van overige vogelsoorten die in bebouwing nestelen (zoals de huiszwaluw).

Tabel 1.1 De te verwachten beschermde gebouw bewonende soorten op de planlocatie op basis van de uitgevoerde quickscan (Visschers, 2020). ¹ Betreft een inschatting op basis van de quickscan (visuele inspectie en deskstudie) gerelateerd aan de beoogde werkzaamheden (paragraaf 1.3). ² Mogelijk dienen wel mitigerende maatregelen te worden getroffen om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen, dit is dan duidelijk beschreven in de quickscan.

Soort	Potentie	Overtreding Wet nb ¹
Huismus	Nee, wegens gebrek essentiële habitatkenmerken en verspreiding	Nee
Gierzwaluw	Nee, geen geschikte openingen	Nee
Vleermuizen	Ja	Mogelijk
Gewone dwergvleermuis	Ja	Mogelijk
Ruige dwergvleermuis	Ja	Mogelijk
Laatvlieger	Ja	Mogelijk
Gewone grootoorvleermuis	Nee, geen agrarisch gebied en teveel licht(verstoring)	Nee ²
(Massa)winterverblijfplaats gewone dwergvleermuis	Nee, beperkte hoogte	Nee
Essentieel foerageergebied	Nee	
Essentiele vliegroute	Nee	
Spreeuw (cat. 5)	Nee	Nee
Huiszwaluw (cat. 5)	Ja, wit overstek	Nee ²
Steenmarter	Nee, geen geschikte openingen	Nee ²



Figuur 1.3 Middels losliggende dakpannen en tussen kierende kozijnen kunnen vleermuizen toegang krijgen tot potentiële verblijfplaatsen in de woningen.

1.5 Kader Wet natuurbescherming

De soortenbescherming van Wet natuurbescherming valt op grond van internationale verdragen en nationaal beschermde soorten, uiteen in drie verschillende beschermingsregimes. Deze beschermingsregimes betreffen de Vogelrichtlijn (art. 3.1), Habitatrichtlijn (art. 3.5) en de nationaal beschermde soorten (art. 3.10). Vleermuizen vallen onder de bescherming van de Habitatrichtlijn. Naar aanleiding van de beoogde ingreep (paragraaf 1.3) kan overtreding van de volgende verbodsbepalingen optreden:

Wnb, art 3.5 lid 2 en 4 (Habitatrichtlijnsoorten)

Lid 2: Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren

Lid 4: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid (alle vleermuissoorten) te beschadigen of te vernielen.

2 Methode

2.1 Theoretisch kader

Ten behoeve van ecologische onderzoek naar een aantal beschermde soorten in Nederland zijn door experts richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn in zekere mate juridische kaders gaan vormen bij de toetsing van onderzoeken op juistheid en volledigheid. Voor vleermuizen geldt het Vleermuisprotocol (NGB, 2017) als richtlijn. De richtlijnen worden met enige regelmaat door de opstellers geëvalueerd en indien noodzakelijk aangepast. De uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd in de richtlijnen vormen de basis voor het soort specifiek onderzoek wat wordt uitgevoerd door Blom Ecologie B.V. In tabel 2.1 wordt voor de desbetreffende beschermde gebouw bewonende soorten beknopt weergegeven wat de onderzoeksperioden en methode zijn.

Tabel 2.1 Samenvatting van de uitgangspunten ten behoeve van vleermuisonderzoek zoals deze zijn geformuleerd in het Vleermuisprotocol (NGB, 2017).

Vleermuizen
<i>Kraamverblijfplaats:</i> Aantoonbaar door onderzoek in de periode (10 mei) 15 mei t/m 15 juli (20 juli) (2x veldbezoek). Indien meerdere soorten worden meegenomen kan het aantal veldbezoeken oplopen tot 3. Onderzoek is visueel en gericht op in- of uitvliegende individuen. Onderzoek wordt uitgevoerd m.b.v. een batdetector.
<i>Zomerverblijfplaats:</i> Aantoonbaar door onderzoek in de periode (1 april) 15 mei t/m 15 augustus (1 december) (2x veldbezoek). De periode is sterk afhankelijk van de soort, indien meerdere soorten worden meegenomen kan het aantal veldbezoeken oplopen tot 3. Onderzoek is visueel en gericht op in- of uitvliegende individuen. Onderzoek wordt uitgevoerd m.b.v. een batdetector.
<i>Paarverblijfplaats:</i> Aantoonbaar door onderzoek in de periode (15 juli) 15 augustus t/m 1 oktober (1 november) (2x veldbezoek). De periode is sterk afhankelijk van de soort, indien meerdere soorten worden meegenomen kan het aantal veldbezoeken oplopen tot 3. Onderzoek is visueel en gericht op in- of uitvliegende individuen, territoriaal gedrag en sociale geluiden. Onderzoek wordt uitgevoerd m.b.v. een batdetector.
<i>Essentieel foerageergebied¹:</i> Aantoonbaar door onderzoek in de periode (1 april) 15 april t/m 1 oktober (1 november) (2x veldbezoek). De periode is sterk afhankelijk van de soort, indien meerdere soorten worden meegenomen kan het aantal veldbezoeken oplopen tot 3. Onderzoek is visueel en gericht op foeragerende individuen. Onderzoek wordt uitgevoerd m.b.v. een batdetector.
<i>Essentiële vliegroute¹:</i> Aantoonbaar door onderzoek in de periode (1 april) 15 april t/m 1 oktober (1 november) (2x veldbezoek). De periode is sterk afhankelijk van de soort, indien meerdere soorten worden meegenomen kan het aantal veldbezoeken oplopen tot 3. Onderzoek is visueel en gericht op migrerende individuen. Onderzoek wordt uitgevoerd m.b.v. een batdetector eventueel in combinatie met een zaklamp of warmtebeeld. (Kennisdocument gewone dwergvleermuis, BIJ12 & Vleermuisprotocol, maart 2017)
<i>Vervolg op volgende pagina.</i>


¹ Onder een essentieel foerageergebied wordt verstaan een foerageergebied dat van wezenlijk belang is voor het functioneren van de voortplantingsplaats of rustplaats wanneer er geen alternatieve foerageergebieden zijn om eventuele aantasting daarvan op te vangen. Onder een essentiële vliegroute wordt verstaan een vliegroute die van wezenlijk belang is als er geen goede alternatieve vliegroute is om vanuit de voortplantingsplaats of rustplaats een essentieel foerageergebied te bereiken of omvliegen vanuit de voortplantingsplaats of rustplaats naar een essentieel foerageergebied via een alternatieve route teveel energie kost (o.a. uitspraak RvS 201708426/1/R2, 3 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2169).

2.2 Praktische uitvoering

De praktische uitvoering valt uiteen in standaardprocedure tijdens elk veldbezoek, de reactieve onderzoekswijze die gehanteerd wordt en, indien van toepassing, de aanvullende onderzoeksmethodes.

Procedure

Op basis van de te verwachten soorten en de relatieve potentie voor deze soorten binnen het plangebied wordt het aanvullende onderzoek ingericht. Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering wordt bekeken vanaf welke posities de planlocatie (gevels/daken/kierende kozijnen) het meest efficiënt (strategisch) kan worden onderzocht. De strategische punten, looproute en zichtlijnen zijn afhankelijk van de aanwezigheid van obstructies, struiken/bomen, verlichting en diverse typen van bebouwing. Tevens zijn deze afhankelijk van de te onderzoeken soortgroep. In figuur 2.1 worden de strategische punten en de meest gebruikte looproutes weergegeven.



Figuur 2.1 Overzicht van de strategische punten en de meest gebruikte looproutes op de planlocatie.

De procedure tijdens ieder veldbezoek is als volgt:

1. Bepalen strategische punten voorafgaand aan start onderzoek.
2. Overleg met collega('s) op kantoor over bezetting strategische punten en looproutes. Als het een vervolgronde betreft worden de resultaten van de eerdere rondes hierin meegenomen;
3. Controle gevels op aanwezigheid van uitwerpselen onder en/of tegen de gevels. Eventueel navraag bij bewoners op (recente) activiteit van huismus, gierzwaluw en vleermuizen¹;
4. Start/uitvoering onderzoek/bezetting strategische punten en uitvoering conform reactieve onderzoekswijze;
5. Afronding onderzoek, bespreken met collega('s) op kantoor van tussentijds resultaat, eventuele onduidelijkheden over verblijfplaatsen en waarnemingen worden in dit stadia goed ondervangen.

¹Op basis van uitwerpselen kan vaak een goede eerste indruk worden verkregen waar nesten van gierzwaluw en grotere verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.

Reactieve onderzoekswijze

Binnen de kaders van het Vleermuisprotocol (tabel 2.1) is de onderzoekswijze vormvrij. Afhankelijk van omstandigheden zoals de relatieve potentie, ervaring, moment van onderzoek het aantal onderzoekers, en dergelijke, worden door de diverse onderzoeksbureaus op verschillende wijze onderzoek uitgevoerd. Aangezien de te onderzoeken soorten veelal voorkeur hebben voor bepaalde type verblijfsplaatsen en leefgebied wordt door Blom Ecologie B.V. reactief onderzoek uitgevoerd. Dit type onderzoek houdt vast aan strategische punten en looproutes waarbij het geobserveerde gedrag van de te onderzoeken soort en de lokale omstandigheden leidend zijn voor de keuze van de strategische punten of looproute en de verblijfsduur per punt. De strategische punten worden bepaald op locatie voorafgaand aan de start van een onderzoek door een visuele beoordeling op de actuele potentie voor de soort in kwestie. Deze punten kenmerken zich door goed overzicht binnen het plangebied en zicht op zoveel mogelijk potentiële in- of uitvliegopeningen.

Het aanvullend vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd door een combinatie van strategische punten en looproutes. Tijdens het eerste veldbezoek (zowel in het voorjaar als najaar) worden strategische punten ingenomen. Op het moment dat er sprake is van uitvliegende vleermuizen beweegt de onderzoeker zich in tegenovergestelde richting (dus de vleermuis tegemoet) naar het volgende strategische punt om zo een eventueel tweede of daaropvolgende uitvliegend individu, en uiteindelijk zo mogelijk de kolonieverblijfplaats, te lokaliseren. Hierbij blijft de nadruk op de bebouwing die binnen het plangebied valt. Tijdens de vervolgonderzoeken wordt per seizoen de strategische punten ingenomen waar op dat moment de hoogste trefkans is. Afhankelijk van het doel van het aanvullend onderzoek (e.g. kraamverblijfplaatsen, functioneel leefgebied e.d.) wordt de nadruk gelegd op strategische punten (zomerverblijfplaatsen, vliegroutes) of strategische looproutes (paarverblijfplaatsen). Voor alle onderzoeken geldt dat tijdens de rondes de keuze van strategische punten en/of looproutes beïnvloed worden door veranderende omstandigheden. Dit kan zijn een plotselinge verandering van windrichting, sterke toename of afname van windkracht, defecte straatverlichting en dergelijke.

Het aantal factoren dat bepaalt waarom een onderzoeker juist de ene richting meer op kijkt dan de andere of er juist voor kiest af te wijken van een gebruikelijke route (door bijv. buurtbewoners die de onderzoeker aan de praat houden, bewoners die honden uitlaten of dergelijke) zijn niet of nauwelijks definieerbaar.

De wijze van onderzoek verschilt, met in achtneming van de randvoorwaarden van het Vleermuisprotocol, dus per datum, per loopronde en per moment. Er is derhalve geen sprake van vaste transecten maar veel eerder van diverse looproutes naar strategische punten waarbij de frequentie van stilstaan en beweging afhankelijk zijn van de omstandigheden op dat moment.

Aanvullende onderzoeksmethodes

Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een aanvullende onderzoeksmethodes. Deze aanvullende onderzoeksmethodes zijn niet opgenomen in de richtlijnen voor het aanvullend onderzoek maar ze leveren waardevolle informatie die gebruikt wordt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten van de reguliere inventarisatiemethode.

De warmtebeeldcamera (type Pulsar Helion XP28) wordt specifiek ingezet tijdens het vleermuisonderzoek. Het inzetten van de warmtebeeldcamera is met name waardevol voor de lokalisatie van grootschalige verblijfplaatsen zoals kraamverblijfplaatsen. De warmtebeeldcamera wordt vooral gebruikt ter ondersteuning van de waarnemingen die eerder met de batdetector zijn gedaan en is gericht op het lokaliseren van de verblijfplaats (op grotere) hoogte. Daarnaast kan een warmtebeeld camera gebruikt worden voor het lokaliseren van vleermuizen die boven de boomtoppen vliegen. Door het gebruik van de warmtebeeldcamera kan een gevel nauwkeurig onderzocht worden en gedrag van de vleermuizen gevolgd worden zonder dat er sprake is van verstoring door licht zoals het geval is als er gebruik gemaakt wordt van zaklampen.

2.3 Inventarisaties

Veldbezoeken

De planlocatie is 5x bezocht door medewerkers van Blom Ecologie B.V. (tabel 2.2). Tijdens deze bezoeken zijn de planlocatie en de directe omgeving onderzocht op de aanwezigheid van huismus, gierzwaluwen en vleermuizen. Tijdens het onderzoek is met name gelet op nest indicerend gedrag van huismus en gierzwaluw alsmede foeragerende/communicerende vleermuizen. Tevens is gelet op de veelgebruikte structuren door huismus en vleermuis voor het bepalen van het functioneel leefgebied.

Tabel 2.2 Veldbezoeken op de planlocatie, met per veldbezoek welke functies onderzocht worden en het aantal waarnemers dat is ingezet. De weersomstandigheden voldeden aan de minimumcriteria zoals opgenomen in de Kennisdocumenten huismus en gierzwaluw en het Vleermuisprotocol (2017).


Veldbezoek	Functie	Aantal pers.	Datum	Zon ▼ ▲	Tijd	Weersomstandigheden
Vleermuizen 1	Zomer (+kraam)	1	09-05-2020	05.55	03.45-06.00	0/8, droog, 0-1 Bft, 10°C
Vleermuizen 2	Kraam + zomer	1	29-05-2020	21.43	21.30-23.45	0/8, droog, 0-1 Bft, 13°C
Vleermuizen 3	Kraam + zomer	1	14-07-2020	21.52	21.45-00.00	8/8, droog, 1-2 Bft, 15°C
Vleermuizen 4	Paar	1	05-08-2020	21.16	22.15-00.30	2/8, droog, 0-1 Bft, 23°C
Vleermuizen 5	Paar	1	27-08-2020	20.36	21.30-23.45	8/8, droog, 1-2 Bft, 21°C

Gebruikte materialen

Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd met behulp van een verrekijker en batdetector, type Petterson 240x. Dit type batdetector is *heterodyne* en heeft een *time expansion* functie. De *time expansion* functie maakt het mogelijk de geluidopnames te vertragen waardoor nauwkeurige analyse van de hoogfrequent geluiden uitgevoerd kunnen worden. Geluidswaarnemingen zijn eventueel opgenomen met een opnameapparaat van het merk Roland, type R-07. Indien inventarisatie in het veld niet mogelijk was zijn geluiden geanalyseerd met behulp van de software BATSOUND.

2.4 Specifieke omstandigheden

De optimale onderzoeksperiode voor paarverblijfplaatsen gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger loopt van 15 augustus – 1 oktober. De suboptimale perioden loopt van 15 juli tot 1 november. De onderzoeksrunde op 5 augustus 2020 valt buiten de optimale, maar nog binnen de suboptimale periode. In onderstaande figuur 2.3 is aangegeven dat voorgenoemde soorten al vanaf medio juni (afhankelijk van de weersomstandigheden) baltsgedrag kunnen vertonen. Op 5 augustus 2020 was het 23°C, droog en weinig wind. Het is hierdoor zeer aannemelijk dat eventuele paarterritoria aanwezig binnen het plangebied, waargenomen zouden zijn.



Figuur 2.3 Aanbevolen inventarisatieperiodes en inventarisatierondes voor de verschillende methoden van vleermuizen. (bron: Brochure Met vleermuizen overweg).

3 Resultaten

3.1 Vleermuizen

Waarnemingen, soorten en aantallen

Tijdens de onderzoeksrondes is enkel de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*) waargenomen binnen of in de directe nabijheid van het plangebied (tabel 3.1).

Tabel 3.1 Waarnemingen en aantallen van vleermuizen gedurende de veldbezoeken.


Veldbezoek	Soort	Aantal	Gedrag
Vleermuis 1 09-05-2020	Gewone dwergvleermuis	1	Foeragerend
	Gewone dwergvleermuis	1	Overvliegend
	Gewone dwergvleermuis	1	Verblijfplaats (18 individuen)
	Gewone dwergvleermuis	1	Verblijfplaats (1 individu)
Vleermuis 2 29-05-2020	Gewone dwergvleermuis	1	Verblijfplaats (15 individuen)
Vleermuis 3 14-07-2020	Gewone dwergvleermuis	2	Foeragerend
	Gewone dwergvleermuis	1	Verblijfplaats (15 individuen)
	Gewone dwergvleermuis	1	Verblijfplaats (20 individuen)
Vleermuis 4 05-08-2020	Gewone dwergvleermuis	1	Baltsend
Vleermuis 5 27-08-2020	Gewone dwergvleermuis	1	Baltsend
	Gewone dwergvleermuis	1	Foeragerend

Verblijfplaatsen

Gedurende het onderzoek zijn in totaal 4 verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis vastgesteld. Er zijn geen verblijfplaatsen binnen het plangebied aanwezig. De vastgestelde verblijfplaatsen betreffen vier zomerverblijfplaatsen. De exacte locatie van de vastgestelde verblijfplaatsen zijn weergegeven in tabel 3.2. In figuur 3.1 is de ruimtelijke spreiding van de vastgestelde verblijfplaatsen weergegeven. In de bijlagen zijn foto's opgenomen van de vastgestelde verblijfplaatsen.

Tabel 3.2 Overzicht waargenomen verblijfplaatsen van vleermuizen. Per type verblijfplaats wordt de functie, het aantal individuen en de omschrijving van de locatie benoemd. GD = gewone dwergvleermuis.

Adres	Soort	Functie	Aantal	Omschrijving
De Pollenbrink 32	GD	Zomer	15	Daklijst
Loostraat 4	GD	Zomer	20	Stootvoeg + daklijst
Buitengracht 2	GD	Zomer	1	Stootvoeg
Markt 57-59	GD	Zomer	18	Nokpan



Figuur 3.1 Overzicht van de verblijfslocaties van vleermuizen in de directe omgeving rondom het plangebied (verantwoording: het kaartmateriaal is vervaardigd in QGIS).

Vliegroutes en foerageergebieden

Gedurende het vleermuisonderzoek is een vliegroute vastgesteld en zijn twee foerageergebieden gedefinieerd. Foeragerende vleermuizen zijn waargenomen boven het tuinperceel van Dorpsstraat 33 en boven de bomenrij langs de Loostraat ter hoogte van de Markt. Beide structuren vallen buiten de grenzen van het plangebied. Gezien de (in)frequente aanwezigheid van foeragerende vleermuizen blijkt dat dit foerageergebied niet van essentieel belang is voor vleermuizen. Langs de Dorpsstraat vonden vliegbewegingen van vleermuizen plaats langs de opgaande bebouwing. Gezien de (in)frequentie van waarnemingen van vliegbewegingen kan worden vastgesteld dat er geen sprake is van een essentiële vliegroute.

3.4 Overige soorten

Naast de te onderzoeken soorten waarvoor het voorliggend onderzoek is uitgevoerd zijn tijdens de veldbezoeken overige soorten waargenomen. De volgende vogelsoorten zijn gedurende de veldbezoeken waargenomen: kauw, merel, steenuil, Turkse tortelduif en zwarte kraai. Deze waarnemingen bestaan met name uit overvliegende, roepende, rustende of foeragerende vogels.

Tijdens het veldbezoek op 9 mei 2020 is door een medewerker een roepende steenuil waargenomen. De steenuil bevond zich in een parkachtig landschap nabij de Kinkelburglaan op een afstand van circa 200 meter ten zuidoosten van de planlocatie. Onder de Wet Natuurbescherming zijn de nesten van de steenuil jaarrond beschermd (categorie 1). Uit verspreidingsgegevens is bekend dat nestlocaties van de steenuil voorkomen langs de zuidelijke rand van Bemmelt, ter hoogte van de Waaldijk (NDFF 2010-2020). Gezien de afwezigheid van geschikte nestlocaties voor de steenuil binnen het plangebied en de directe omgeving, zullen ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied niet tot verstoring leiden.

4 Conclusie

4.1 Vleermuizen

In de periode mei – augustus 2020 is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen binnen het plangebied. Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen in het Vleermuisprotocol (NGB, 2017).

Tijdens het onderzoek zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld binnen het plangebied. De beoogde ontwikkeling leidt niet tot overtreding van een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming art 3.5, lid 4 (wegnemen vaste rust- en/of verblijfplaatsen). Er is geen ontheffing van de Wet natuurbescherming benodigd voor de beoogde ontwikkeling.

4.2 Overige soorten

Het onderzoek beperkte zich in beginsel tot het vaststellen van de aan- dan wel afwezigheid van vleermuizen. Tijdens het onderzoek is tevens gelet op nesten en/of verblijflocaaties van andere soorten op de planlocatie. Dergelijke nesten zijn niet aangetroffen. De bebouwing en struiken bieden echter wel potentie voor broedgevallen van algemene broedvogels. Zoals beschreven staat in de Vogelrichtlijn zijn alle vogels in Nederland beschermd tijdens het broedseizoen (indicatief betreft dit de periode 15 maart t/m 15 juli). Om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen dienen werkzaamheden die mogelijk leiden tot verstoring of aantasting van nesten buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden.

4.3 Vervolgstep(en)

Mits de Algemene zorgplicht en de maatregelen die zijn beschreven in de quickscan rapportage (Visschers, 2020) in acht worden genomen zijn er geen vervolgstappen noodzakelijk.

In de toekomstige situatie mag geen additionele lichtuitstraling plaatsvinden richting de westzijde van de planlocatie. Dit betreft aannemelijk een essentiële vliegroute voor vleermuizen.

5 Bronnen

BIJ12, 2017. Kennisdocument gewone dwergvleermuis *Pipistrellus pipistrellus*. BIJ12, Utrecht

NGB, Zoogdiervereniging en GaN, 2017. Vleermuisprotocol, versie maart 2017

Gebruikte websites

www.arcgis.nl

www.ruimtelijkeplannen.nl


www.vleermuisprotocol.nl

www.ndff.nl

www.kadastralekaart.com


www.vogelbescherming.nl

Bijlage 1 Overzicht waarnemingen



Figuur 1 *Overzicht van de verblijfslocaties, foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen in de directe omgeving rondom het plangebied (verantwoording: het kaartmateriaal is vervaardigd in QGIS).*

Bijlage 2 Vastgestelde verblijfplaatsen



Figuur 2 Zomerverblijfplaats van de gewone dwergoleermuis onder de daklijst aan De Pollenbrink 32.



Figuur 3 Zomerverblijfplaats van de gewone dwergoleermuis in de open stootvoeg aan de Loostraat 4.



Figuur 4 Zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis in de open stootvoeg aan de Buitengracht 2.



Figuur 5 Zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis onder de nokpan aan de Markt 54-56.

