



Natuurlijke poel

Kruidenrijke vegetatie met enkele
besdragense lagen heesters

Flauwe natuurlijke
oever aanleggen

Schaal 1:500

datum: 07-04-2021

- Aan deze afdruk kunnen geen rechten worden ontleend

Bijlage: Beplantingsplan.

Als beplanting worden er enkele bossages aangeplant welke als struikvormen worden onderhouden. In het sortiment zijn niet alleen vruchtgewassen opgenomen omdat deze al ruimschoots aanwezig zijn op de productiepercelen van Plantaz.

De bossages worden zo ingericht dat het geheel een open structuur houdt.

Sortiment;

<i>Alnus glutinosa</i>	zwarte els
<i>Aronea melanocarpa</i>	appelbes
<i>Carpinus betulus</i>	haagbeuk
<i>Rhamnus frangula</i>	vuilboom
<i>Sambucus nigra</i>	gewone vlier
<i>Corylus avellana</i>	hazelaar
<i>Euonymus europaea</i>	wilde kardinaalsmuts
<i>Ilex aquifolium</i> (struikvormen)	hulst
<i>Ligustrum vulgare</i>	wilde liguster
<i>Viburnum lantana</i>	wollige sneeuwbal
<i>Rosa rubiginosa</i>	egellantier

onderhoud

De aangeplante gewassen zullen weinig onderhoud vragen.

We willen ze zo natuurlijk mogelijk laten groeien.

Bijlage: bloemenmengsels: (mengsels FAB 1 en VB2 van de bolderik.net) en onderhoud

1^e jaar na inzaai:



Mengsels: FAB 1 en VB 2

De meerjarige (vaste) mengsels hebben een ontwikkelingsperiode van ongeveer 1 jaar.

- In dit 1e jaar ontwikkelen de kiemplanten zich tot planten, het volgende groeiseizoen gaan deze planten bloeien.
- Na de inzaai zullen ook de hier de in de bodem aanwezige ongewenste (1jarige) soorten gaan kiemen en sneller dan de vaste soorten die gezaaid zijn, uitgroeien en de gewenste soorten onderdrukken door concurrentie van licht, voedsel en water.
- Ongewenste soorten worden op 10-15 cm gemaaid. Dit maaibeheer wordt herhaald totdat de groei van de ongewenste soorten stopt.
- Na de winter komen deze niet meer, of veel minder terug en is de bodem grotendeels bedekt met de vaste soorten.
- Bij het mengen van vaste mengsels met eenjarige mengsels is dit maaibeheer niet mogelijk.

Het uitwieden van ongewenste soorten in vaste mengsels is minder gewenst omdat hierbij de bodem verstoort raakt en er kiemplanten verloren gaan.

Als een minder net beeld geen probleem is of als er weinig of geen onkruidzaad in de bodem aanwezig is, kan dit maaibeheer (grotendeels) achterwege blijven. Een vast mengsel kan dan eventueel worden gemengd met een 1-jarig mengsel in de verhouding: 1deel 1-jarig : 3-delen vast mengsel.

Maaien 2^e jaar

- September, oktober voor weides op kleigrond of rijkere (bemeste) zandgrond voor de eerste jaren.

Faseren maaibeheer

- Ten behoeve van de vlinders en insecten en andere beestjes worden de maaierwerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd

Bijlage: insectenhotel en valkennest

