Bijlage 2. Schermopnamen van AERIUS-berekening, kenmerk RgwqNqhrSaVp, d.d. 4 maart 2022.



Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
761,40	2.308,05	1,53

Depositieverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting		Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
Naardermeer			
Oostelijke Vechtplassen			
Lg05	Grote-zeggenmoeras	139,55	0,53
H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	18,36	0,49
H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,68	0,49
H91D0	Hoogveenbossen	34,85	0,40
ZGH3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	4,82	0,38
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	21,36	0,27
H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	14,37	0,27
H7210	Galigaanmoerassen	2,04	0,16
H6410	Blauwgraslanden	2,17	0,10
ZGH3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,76	0,10
H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	1,43	0,10
ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,62	0,10
ZGH91D0	Hoogveenbossen	1,29	0,09
H9999:95	Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H7140B)	0,24	0,03

Samenvatting **Per situatie**

Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
Referentie - Referentie	Situatieresultaat	NOx + NH3	Wnb registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
761,40	2.308,05	1,53

Depositieverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting		Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
Naardermeer			
Oostelijke Vechtplassen			
Botshol			
H91D0	Hoogveenbossen	3,08	0,11
H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,85	0,11
H7210	Galigaanmoerassen	0,79	0,11
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	34,90	0,10
ZGH3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	7,36	0,10
H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,15	0,07
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske			
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck			
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder			

Samenvatting **Per situatie**

Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
Referentie - Referentie	Situatieresultaat	NOx + NH3	Wnb registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
761,40	2.308,05	1,53

Depositieverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting		Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
Naardermeer			
Oostelijke Vechtplassen			
Botshol			
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske			
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	52,77	0,05
H91D0	Hoogveenbossen	3,98	0,05
ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,37	0,04
H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,58	0,03
ZGH3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,12	0,03
H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,03	0,03
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck			
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder			

Situatie: Referentie - Referentie | Resultaat: Situatieresultaat | Stof: NOx + NH3 | Weergave: Wnb registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
761,40	2.308,05	1,53

Depositieverdeling | Markers | Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting		Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
Naardermeer			
Oostelijke Vechtplassen			
Botshol			
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske			
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck			
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	123,30	0,04
H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	50,53	0,03
H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	10,18	0,03
H91D0	Hoogveenbossen	5,98	0,03
Lg02	Geïsoleerde meander en petgat	1,09	0,03
H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	14,10	0,02
H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,87	0,02
H6410	Blauwgraslanden	0,44	0,02
H7210	Galigaanmoerassen	0,21	0,01

Samenvatting | Per situatie

Situatie: Referentie - Referentie | Resultaat: Situatieresultaat | Stof: NOx + NH3 | Weergave: Wnb registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
761,40	2.308,05	1,53

Depositieverdeling | Markers | Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting		Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
Naardermeer			
Oostelijke Vechtplassen			
Botshol			
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske			
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck			
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder			
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	3,70	0,02
Polder Westzaan			

Samenvatting | Per situatie

Situatie: Referentie - Referentie | Resultaat: Situatieresultaat | Stof: NOx + NH3 | Weergave: Wnb registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
761,40	2.308,05	1,53

Depositieverdeling | Markers | Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting		Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
Naardermeer			
Oostelijke Vechtplassen			
Botshol			
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske			
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck			
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder			
Polder Westzaan			
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	3,57	0,02

133240, 482292

Samenvatting Per situatie

Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
Gewenst - Beoogd	Situatieresultaat	NOx + NH3	Wnb registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
761,40	2.308,05	1,53

Depositieverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting		Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
Naardermeer			
H91D0	Hoogveenbossen	77,77	1,53
Lg05	Grote-zeggenmoeras	74,03	1,53
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	22,65	1,51
H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	9,59	1,51
H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	7,64	1,51
H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,11	1,33
H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,73	1,19
ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,67	0,72
H9999:94	Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H7140B).	1,56	0,71
ZGH3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11	0,34
H6410	Blauwgraslanden	2,02	0,26

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
761,40	2.308,05	1,53

Depositieverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting		Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
Naardermeer			
Oostelijke Vechtplassen			
Lg05	Grote-zeggenmoeras	139,55	0,52
H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	18,36	0,49
H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,68	0,49
H91D0	Hoogveenbossen	34,85	0,40
ZGH3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	4,82	0,38
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	21,36	0,27
H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	14,37	0,27
H7210	Galigaanmoerassen	2,04	0,16
H6410	Blauwgraslanden	2,17	0,10
ZGH3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,76	0,10
H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	1,43	0,10
ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,62	0,10
ZGH91D0	Hoogveenbossen	1,29	0,09
H9999:95	Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H7140B).	0,24	0,03

132649, 482449

Samenvatting Per situatie

Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
Gewenst - Beoogd	Situatieresultaat	NOx + NH3	Wnb registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
761,40	2.308,05	1,53

Depositieverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting		Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
Naardermeer			
Oostelijke Vechtplassen			
Botshol			
H91D0	Hoogveenbossen	3,08	0,11
H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,85	0,11
H7210	Galigaanmoerassen	0,79	0,11
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	34,90	0,10
ZGH3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	7,36	0,10
H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,15	0,07
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske			
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck			
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder			

Samenvatting **Per situatie**

Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
Gewenst - Beoogd	Situatieresultaat	NOx + NH3	Wnb registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
761,40	2.308,05	1,53

Depositieverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting		Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
Naardermeer			
Oostelijke Vechtplassen			
Botshol			
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske			
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	52,77	0,05
H91D0	Hoogveenbossen	3,98	0,05
ZGH7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,37	0,04
H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,58	0,03
ZGH3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,12	0,03
H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,03	0,03
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck			
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder			

Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
Gewenst - Beoogd	Situatieresultaat	NOx + NH3	Wnb registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
761,40	2.308,05	1,53

Depositieverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting		Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
Naardermeer			
Oostelijke Vechtplassen			
Botshol			
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske			
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck			
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	123,30	0,04
H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	50,53	0,03
H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	10,18	0,03
H91D0	Hoogveenbossen	5,98	0,03
Lg02	Geisoleerde meander en petgat	1,09	0,03
H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	14,10	0,02
H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,87	0,02
H6410	Blauwgraslanden	0,44	0,02
H7210	Galigaanmoerassen	0,21	0,01

Samenvatting **Per situatie**

Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
Gewenst - Beoogd	Situatieresultaat	NOx + NH3	Wnb registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
761,40	2.308,05	1,53

Depositieverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting		Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
Naardermeer			
Oostelijke Vechtplassen			
Botshol			
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske			
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck			
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder			
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	3,70	0,02
Polder Westzaan			



Samenvatting Per situatie

Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
Gewenst - Beoogd	Situatieresultaat	NOx + NH3	Wnb registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
761,40	2.308,05	1,53

Depositieverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting		Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)
Naardermeer			
Oostelijke Vechtplassen			
Botshol			
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske			
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck			
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder			
Polder Westzaan			
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	3,57	0,02