



OMG-009635 Bijlage 3. Schermafbeeldingen depositie op habitattypen na extern salderen

AERIUS-verschilberekening gebruiksfase 2029 met kenmerk RcMwhRS7JNfz



AERIUS-verschilberekening aanleg- en gebruiksfase 2028 met kenmerk RRiVZX5GqiEs



Rekentaak 1 - Ink - B129171 - Oceanenweg nr 22, Amsterdam - BY 3 AERIUS Aanlegfase Jaar2 - WnbG_4

Resultaten

Situatie

Resultaat

Stof

Weergave

Aanlegfase Jaar 2 (en half jaar gebruiksfase)

Projectberekening

NO_x + NH₃

OwN2000-registratieset

Bereken (ha gekarteerd)

Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)

Met toename (ha gekarteerd)

Grootste toename (mol N/ha/jr)

4.801,06

4.271,77

0,00

-

Met afname (ha gekarteerd)

Grootste afname (mol N/ha/jr)

4.801,06

0,15

Depositieverdeling

Markers

Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

Bereken (ha gekarteerd)

KDW (mol N/ha/jr)

Grootste toename (mol N/ha/jr)

> Kennemerland-Zuid

> Noordhollands Duinreservaat

> Ilperveld, Varkenland, Oostzanerveld & Twiske

> Botshol

> Naardermeer

> Oostelijke Vechtplassen

> Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

> Polder Westzaan

☒ Eilandspolder

H7140B

Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)

0,21

500,00

-