



*Figuur 1 aan de stamvoet zijn de tonderzwam te zien.*



*Figuur 2 aan de westzijde van de boom gaan er al grotere takken uitvallen. de conditie van de boom wordt slechter.*



Figuur 3 dikrandtonderzwam, dit is een necrotrofe parasiet die de boom zwaar aantast, maar daaraan niet dood gaat. nadat de boom dood is gaat deze soort verder als een saprotrofe soort.

Op 1 oktober zijn ondergetekende en Lars Coolen collega bij Staatsbosbeheer de boom gaan inspecteren. De wens is om de Eik op te ruimen. De inlandse eik (*Quercus robur*) heeft een aantasting met Dikrandtonderzwam (*Ganoderma adspersum* (Schulzer) Donk). Deze soort veroorzaakt witrot en is een (zwakte)parasiet. De boom zal als gevolg van de aantasting niet perse daaraan doodgaan, maar verzwakt flink. Dit heeft gevolgen voor de boom dat er takken doodgaan en uit kunnen breken. In de stam van de boom is zaagwond met een kleine holte die geen vaste verblijfplaats is voor vleermuizen.

Voor vliegroutes van vleermuizen zal de kap van deze boom geen invloed hebben. De lijnvormige in het landschap blijven behouden. De kap van de boom wordt gepland buiten het broedseizoen zodat er geen broedvogels worden verstoord.



Figuur 4 locatie van de Eik t.o.v. woonhuis/kavel

Uiteindelijk zal de boom verder verzwakken en de mogelijkheid dat er andere organismes in komen die de boom verder aantasten wordt aannemelijk.

12 november 2025

Rick Verrijt

Senior Boswachter Ecologie | Middenpeel Staatsbosbeheer

Het risico dat er door de boom ongevallen/schade ontstaat wordt naarmate de boom ouder groter worden. Ook zullen de gevolgen groter zijn, omdat er steeds meer en dikkere takken uit kunnen breken.

Staatsbosbeheer is van mening dat de boom preventief gekapt moet worden om ongevallen/schade te voorkomen.

Opgemaakt 12 november 2025 door Rick Verrijt Senior Boswachter ecologie Middenpeel